



Num. 264. Publicado el 19/04/2010

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tarzetta catinus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 264. Publicado el 19/04/2010

Descripciones de especies

Thecla quercus (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 26 - 30 mm. El macho tiene el anverso de color morado brillante (o marrón, según el ángulo de incidencia de la lu...

Aparece en robledales y zonas arbustivas cercanas a ellos, especialmente en lugares cálidos, desde el nivel del mar hasta 1500 metros. Vuela desde jul...

Está extendida por el norte de África y Europa hasta Asia. Se encuentra presente en la mayor parte de la Península Ibérica, especialmente en el norte ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thecla-quercus.html>

Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier

Macroscopía: ascomas cupuliformes de hasta 30 mm de diámetro, con el himenio, liso o rugoso, de color ocre o pardo ocráceo, frecuentemente perforado e...

Vive parasitando los rizomas enterrados, negruzcos y estromatizados de *Polygonatum*...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stromatinia-rapulum.html>

Smyrniium olusatrum L.

Planta bienal con tallos de 60 - 130 cm, erectos, rígidos, con surcos pero sin alas, con ramas opuestas en la parte superior. Las hojas basales, entre...

Crece en lugares frescos y más o menos umbrosos, en suelos nitrificados desde el nivel del mar a los 800 m. ...

Aparece en el oeste y sur de Europa, Macaronesia y el norte de África. En la Península Ibérica y Baleares por casi todo el territorio...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/smyrniium-olusatrum.html>

Pyrgus cirsii (Rambur, 1840)

Mariposa con una envergadura alar de entre 24 y 28 mm. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con numerosas manchas blancas bien marcadas e...

Vive en prados floridos y zonas de matorral, especialmente en terrenos calizos, entre 800 y 1800 metros de altitud. Vuela de julio a septiembre, en



un...

Aparece por la Península Ibérica y parte del sur y centro de Europa. Se encuentra ampliamente repartida por la Península Ibérica, excepto por su parte...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-cirsii.html>

Lysidice ninetta Andouin & Milue Edwards, 1833

Gusano de cuerpo alargado, estrecho y cilíndrico, de 15cm de longitud como máximo y hasta 200 segmentos. Color rosáceo con un collar blanco entre los ...

Habita en fondos sobre rocas, corales, grava, piedras, arena y limo desde la zona intermareal hasta profundidades de 350 m. También se le puede encont...

Cosmopolita de mares cálidos o templado-cálidos....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lysidice-ninetta.html>

Novedades corológicas

Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pintueles, Piloña. ASTURIAS el día 14/04/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stromatinia-rapulum-bull-boudier-1/8894.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agalenatea redii (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) (Arthropoda)

Narcissus bulbocodium subsp. *nivalis* (Magnoliophyta)

Stromatinia rapulum (Bull.) Boudier (Ascomycota)

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter (Basidiomycota)

