



## Num. 267. Publicado el 10/05/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Puccinia menthae*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 267. Publicado el 10/05/2010**

## Descripciones de especies

### *Ranunculus gramineus* L.

Planta perenne con tallos de 10 a 40 cm, estolonífera en ocasiones, glabra o pelosa. Las hojas basales son muy características y ayudan a diferenciarl...

Crece en pastos más o menos secos, en collados ventosos, también en cantiles rocosos, pedregales e incluso en las fisuras de las rocas, tanto en suelo...

Aparece en el S y O de Europa y el N de África. En la Península está disperso por todo el territorio, si bien es más raro en las zonas atlánticas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-gramineus.html>

### *Phomatospora luteotingens* J. Fourn. & C. Lechat

Macroscopía: ascomas inmersos, parcialmente errumpentes en la madurez, gregarios pero dispersos, raramente en mutuo contacto, de hasta 600 x 300 mm de...

Crece sobre madera semisumergida....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phomatospora-luteotingens.html>

### *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 38 a 42 mm. El macho tiene el anverso de color leonado con dibujo reticulado marrón oscuro, con un oculo con núcl...

Se encuentra en caminos y claros de bosque, desde el nivel del mar hasta 1700 metros y vuela de febrero a noviembre, en dos o más generaciones. Los im...

Está extendida por el norte de África y toda Europa hasta los Urales. Está presente en toda la Península Ibérica y Baleares. Es común en toda Asturias...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pararge-aegeria.html>

### *Orobanche caryophyllacea*

Planta parásita anual o perenne, con un tallo de 8 a 40 cm, simple, con pelos glandulíferos y de color rosado o cremoso. Las hojas, de 15 - 30 x 3 -



7...

Es una planta que parasita diferentes especies de rubiáceas, especialmente las pertenecientes al género Galium. Aparece en pastos o zonas rocosas desd...

Aparece en el S y C de Europa y el O de Asia, y posiblemente en el N de África. En la Península es común en el centro, N y E....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-caryophyllacea.html>

## *Melampsora euphorbiae* (C. Schub.) Castagne

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que intervienen eciosoros pequeños que se desarrollan en hojas, peciolos e inflorescencias, de c...

Es muy fácil de encontrar sobre *Euphorbia helioscopia* y *Euphorbia peplus* desde la primavera al otoño....

Presente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-euphorbiae.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1789) (Arthropoda)

*Convallaria majalis* L. (Magnoliophyta)

*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr. (Ascomycota)

*Helvella lactea* Boud. (Ascomycota)

*Kermes ilicis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Lachnum nudipes* (Fuckel) Nannf. (Ascomycota)

*Melanconiella chrysomelanconium* Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

*Neotinea maculata* (Desf.) Stearn (Magnoliophyta)

*Phomatospora luteotingens* J. Fourn. & C. Lechat (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

