



Num. 269. Publicado el 24/05/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hemitrichia serpula*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 269. Publicado el 24/05/2010

Descripciones de especies

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su colorido. El macho tiene el anverso de color de fondo amarillento, con un mosaico de manchas negras y rojas muy dis...

Vive en laderas herbosas y lugares abiertos y secos, desde zonas bajas hasta los 1600 metros. Vuela de marzo a junio, en una generación al año; los im...

Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica (salvo la zona cantábrica) y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está distrib...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zerynthia-rumina.html>

Sisyrinchium angustifolium Miller

Planta herbácea perenne, cespitosa, de hasta 45 cm. Los tallos son ramificados, comprimidos y con 2 alas, con 1 o 2 nudos, de 2.3 a 5 mm de ancho, gla...

Crece en herbazales en cunetas, orlas y claros de bosques, desde los 10 a 400 m de altitud....

Especie originaria del este de Norteamérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sisyrinchium-angustifolium.html>

Saccobolus beckii Heimerl

Macroscopía: ascomycete coprófilo que forma ascomas sésiles, superficiales o subsuperficiales, aislados o gregarios, globulosos a turbinados, blanquec...

Crece sobre excrementos de cérvidos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-beckii.html>

Melampsora hypericorum (DC.) J. Schröt.,

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que forma ecidiosoros hipófilos, redondeados u oblongos, pulvinosos, generalmente pequeños y su...

Crece sobre *Hypericum androsaemum*, *Hypericum humifusum*, *Hypericum perforatum*, *Hypericum pulchrum* y otras especies del género....



Presente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-hypericorum.html>

Aristolochia paucinervis Pomel

Planta perenne con un rizoma tuberoso, fusiforme o cilíndrico, con tallos de hasta 45 cm, numerosos y ascendentes, que se encuentran generalmente rami...

Crece en matorrales aclarados, en cultivos y en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Vive en la Región Mediterránea y Macaronésica; en la Península aparece en casi todo el territorio....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-paucinervis.html>

Novedades corológicas

Dencoeliopsis johnstonii (Berk.) Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 19/05/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dencoeliopsis-johnstonii-berk-korf-1/9081.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthocharis belia (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Dencoeliopsis johnstonii (Berk.) Korf (Ascomycota)

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Pogonocherus hispidulus (Arthropoda)

Rhizotrogus marginipes (Arthropoda)

Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Sisyrinchium angustifolium (Magnoliophyta)



Taphrina deformans (Berk.) Tul. (Ascomycota)

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. (Magnoliophyta)

Trochila craterium (DC.) Fr. (Ascomycota)

