



## Num. 27. Publicado el 13/06/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Honckenya peploides*. Por César Fernández González



**Num. 27. Publicado el 13/06/2005**

## Descripciones de especies

*Stramonita haemastoma* (Linnaeus, 1767)

Concha muy sólida, de 8 cm de altura. Presenta unas series de tubérculos más o menos marcados, dispuestos en filas, una en las primeras vueltas (peque...

Sobre rocas desde la zona intermareal....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stramonita-haemastoma.html>

*Peyssonnelia atropurpurea* Crouan et Crouan

Talo formado por expansiones lobuladas, a modo de costra, fijadas al sustrato por rizoides finos. Mide entre 5 y 15 cm de longitud, de textura suave, ...

Sobre rocas, piedras, en zonas umbrías, tanto en zonas calmadas como expuestas....

Desde las Islas Británicas a Marruecos y el Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica y Australia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peyssonnelia-atropurpurea.html>

*Nitophyllum punctatum* (Stackhouse) Greville

Fronde de 10 a 50 cm de longitud, ancha, en forma de cuña. De un pequeño disco basal surge la lámina, a veces con una pequeña estipe de 2 mm de longit...

En charcas o sublitoral, sobre rocas, algas (*Laminaria hyperborea*) o conchas, hasta los 24 m de profundidad. Generalmente en lugares moderadamente exp...

Desde el norte de Europa al Mediterráneo. Mauritania, India y Pakistán....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nitophyllum-punctatum.html>

*Ircinia oros* (Pallas, 1864)

Espanja de 6 a 12 cm de diámetro, de color oscuro, pardo, grisáceo o blanquecino, dependiendo de la luz. La superficie es áspera, con grandes elevacio...



En lugares umbríos, entrada de cuevas, grietas, entre 9 y 40 m....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ircinia-oros.html>

## *Haliclona oculata* (Pallas, 1766)

Esponja con forma de árbol, de hasta 30 cm de altura, de consistencia robusta pero flexible. La sección de las ramas es redondeada, con los ápices tam...

Sublitoral, en rocas o bloques....

Toda la costa de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-oculata.html>

## *Echinaster sepositus* (Retzius, 1783)

Estrella de hasta 25 cm de diámetro, con un disco pequeño, brazos largos y de sección cilíndrica, que se adelgazan hacia el extremo. Las espinas son p...

En rocas, arena, hasta 200 m de profundidad....

Desde la costa atlántica francesa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echinaster-sepositus.html>

## *Dysidea fragilis* (Montagu, 1818)

Esponja que puede presentarse incrustante (5 a 7.5 mm de grosor) o masiva (hasta 30 cm), lobulada, con extremos redondeados, de 30 a 50 mm de ancho. L...

En aguas poco profundas, sobre rocas, en grietas y también en charcas....

Atlántico y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dysidea-fragilis.html>

## *Bonnemaisonia asparagoides* (Woodward) Agardh

Talo del gametofito constituido por ejes de color rojo intenso, de hasta 40 cm de longitud y fijados al sustrato por un disco basal. Ejes cilíndricos ...

Talo del gametofito constituido por ejes de color rojo intenso, de hasta 40 cm de longitud y fijados al sustrato por un disco basal. Ejes cilíndricos ...



Desde Noruega a Marruecos, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bonnemaisonia-asparagoides.html>

## *Aplysia fasciata* Poiret, 1789

Individuos grandes, que llegan hasta 40 cm de longitud; cuerpo de color jaspeado negro o pardo oscuro, generalmente con un reborde púrpura o rojo en l...

Entre algas, de las que se alimenta recorriendo el fondo, y nadando trayectos cortos....

Costas de Francia, España y el Mediterráneo. Es raro en las Islas Británicas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-fasciata.html>

## *Aplysia depilans* Gmelin, 1791

Liebre de mar que alcanza 30 cm de longitud, de color verde oscuro a pardo, con parches blancos, amarillos o verdes, y a veces con venación o reticula...

Entre algas, de las que se alimenta recorriendo el fondo....

Desde el SO de Inglaterra al Mediterráneo y la costa N de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aplysia-depilans.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Angelica pachycarpa* Lange (Magnoliophyta)

*Calidris maritima* (Brunnich, 1764) (Chordata)

*Chromodoris krohni* (Mollusca)

*Parablennius sanguinolentus* (Pallas, 1814) (Chordata)

*Petrosia ficiformis* (Porifera)

