



## Num. 271. Publicado el 07/06/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hippocrepis comosa*. Por César Fernández González



**Num. 271. Publicado el 07/06/2010**

## Descripciones de especies

### *Sorbus hybrida*

Árbol de hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes pelosas con lenticelas y la corteza lisa y grisácea; tienen yemas de entre 5 y 9 mm, de forma cónico ...

Este árbol crece en abedulares, robledales, hayedos, claros y orlas, y también en piñales, sobre sustratos ácidos o básicos, desde los 300 a los 1800...

Aparece en el N, centro y SO de Europa, y en la Península en los Montes de León, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, siendo muy raro en la Sierra...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-hybrida.html>

### *Puccinia iridis* Wallr.

Roya que forma uredosoros en el haz y el envés de las hojas, solitarios o agrupados, redondados, oblongos o alargados, al principio cubiertos por la e...

Crece en hojas de *Chamaeiris foetidissima* y en menor medida en otras especies del género....

Común en la zona centro y norte de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-iridis.html>

### *Polyommatus dorylas* (Fruhstorfer, 1910)

El macho tiene el anverso de color azul claro brillante, con márgenes negros estrechos; el reverso es pardo grisáceo, con anchos márgenes blancos y pu...

Vive en prados, zonas abiertas y laderas floridas, desde el nivel del mar a 1800 metros. Vuela desde mayo a octubre, en dos generaciones al año. Los m...

Está extendida por el sur y centro de Europa hasta el Cáucaso. En la Península Ibérica está presente en una franja en la zona norte que va desde los P...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-dorylas.html>



## *Orchis pallens* L.

Orquídea con tallos que surgen de dos tubérculos, de entre 15 y 39 cm, lisos y glabros, con escamas basales envainadoras y escariosas. Las hojas basales...

Crece en prados, cervunales, rellanos o pie de cantiles y claros de hayedos, abetales o pinares, desde los 600 a los 2200 m de altitud...

Aparece en el sur de Europa, desde los Balcanes y Crimea a la Península Ibérica, donde es posible observarla en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orchis-pallens.html>

## *Erebia oeme* (Hübner, [1804])

Es una especie variable. El macho tiene las manchas anaranjado-rojizas poco desarrolladas, más lo están en la hembra, encuadrando un número variable de...

Vive en praderas húmedas, turberas, márgenes de riachuelos y claros de bosque, en una generación al año, entre 800 y 2600 m. Vuela de junio a primeros...

Está presente en los Pirineos, Alpes, Jura y Balcanes. En España solo vuela en los Pirineos de Huesca y Lleida. Es una especie localizada pero abunda...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-oeme.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthostoma cubiculare* (Fr.) Nitschke (Ascomycota)

*Anthracoidea arenariae* (Syd.) Nannf. (Basidiomycota)

*Centrotus cornutus* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Clypeosphaeria mamillana* (Fr.) Lambotte (Ascomycota)

*Puccinia asphodeli* Moug. (Basidiomycota)

*Puccinia iridis* Wallr. (Basidiomycota)

*Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)



*Urocystis anemones* (Pers.) G. Winter (Basidiomycota)

