



## Num. 275. Publicado el 05/07/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Polypodium cambricum subsp. serrulatum*. Por César Fernández González



**Num. 275. Publicado el 05/07/2010**

## Descripciones de especies

### *Puccinia circaeae* Pers.

Hongo de tipo roya en cuya ciclo de vida no forma ni eciosoros y uredosoros, siendo sólo bien visibles los teliosoros, que pueden ser primarios o secu...

Crece sobre *Circaea lutetiana* y otras especies del género....

Es un hongo común en la parte norte de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-circaeae.html>

### *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)

Es una de las mariposas de mayor tamaño de Europa, con una envergadura alar de 62 - 70 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo castaño oscuro,...

Vive en claros de bosque, bordes de caminos, valles, zonas abiertas en montañas y bosques de ribera, desde el nivel del mar hasta más de 2000 metros. ...

Está extendida por Europa, Asia y gran parte de Norteamérica . En la Península Ibérica está presente principalmente en la zona norte, y también en el ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nymphalis-antiopa.html>

### *Halimium lasianthum subsp. alyssoides* (Lam.) Greuter

Planta perenne sufruticosa o arbusto compacto, de hasta 1.5 m, decumbente o erecto, en ocasiones casi pulvinular. Las ramillas están cubiertas de un t...

Esta planta crece en brezales o, por excepción, jarales y subsuelo de pinares, en suelo húmedo, silíceo o arenoso, desde los 350 a los 1800 m. ...

Aparece en el NO de la Península Ibérica y el SO de Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimium-lasianthum-subsp-alyssoides.html>

### *Erebia gorge* (Hübner, 1805)

Se trata de una especie muy polimorfa. El macho tiene generalmente el anverso de color marrón oscuro con anchas bandas rojas brillantes en el ala



ante...

Vive en morrenas y laderas rocosas, desde 1600 hasta más de 2000 metros. Vuela de julio a agosto en una generación al año. Al parecer se trata de una ...

Está extendida de forma dispersa por zonas montañosas del sur de Europa. En la Península Ibérica está presente en los Pirineos (donde vuela la f. ramo...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-gorge.html>

## *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)

El pardillo común es un ave esbelta y estilizada, de 13 cm de longitud y 21 - 25 cm de envergadura; la cola es larga y el pico corto y grisáceo.

Tanto...

El pardillo vive en zonas abiertas, tanto de la costa, de la meseta o incluso montañas. Es fácil de contemplar en zonas de cereales, olivares, sabinar...

Es ave que aparece por todo Eurasia y de la que se han descrito varias subespecies, apareciendo en la Península la subespecie *cannabina* y en Canarias ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-cannabina.html>

## **Novedades corológicas**

()

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stamnaria-sp-1/9365.html>

()

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 02/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stamnaria-sp-1/9369.html>

## *Diplonaevia glacialis* (Rehm) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 29/06/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diplonaevia-glacialis-rehm-sacc-1/9328.html>

## *Hyalopeziza raripila* (Höhn.) Huhtinen (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Teverga, Teverga. ASTURIAS el día 29/06/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/9333.html>



*Inocybe flocculosa* (Herink) Kuyper (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 04/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-flocculosa-var-crocifolia-herink-kuyper-1/9377.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Abraxas sylvata* (Arthropoda)

*Calocoris nemoralis* (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

*Colostygia pectinaria* (Arthropoda)

*Diacrisia sannio* (Arthropoda)

*Diplonaevia glacialis* (Rehm) Sacc. (Ascomycota)

*Efibulobasidium albescens* (Sacc. & Malbr.) K. Wells (Basidiomycota)

*Golovinomyces cichoracearum* (Ascomycota)

*Hyalopeziza raripila* (Höhn.) Huhtinen (Ascomycota)

*Inocybe flocculosa* (Herink) Kuyper (Basidiomycota)

*Microbotryum violaceum* (Pers.) G. Deml & Oberw. (Basidiomycota)

*Puccinia circaeae* Pers. (Basidiomycota)

*Pyronema omphalodes* (Bull.) Fuckel (Ascomycota)

*Russula violeipes* Quél. (Basidiomycota)

*Segestria florentina* (Rossi, 1790) (Arthropoda)

*Stamnaria americana* Masee & Morgan (Ascomycota)

*Uromyces anthyllidis* (Grev.) J. Schröt. (Basidiomycota)



*Uromyces limonii* (DC.) Lév. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008