



Num. 279. Publicado el 02/08/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hypochoeris radicata*. Por César Fernández González



Num. 279. Publicado el 02/08/2010

Descripciones de especies

Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) P. Karst.

Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital completo, formado por las siguientes fases: Espermogonios melosos y cónicos, escasos. Eciosoros generalmente...

Crece parasitando *Polygonum aviculare*....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-polygoni-avicularis.html>

Puccinia calthicola J. Schröt.

Hongo de tipo roya que forma espermogonios anfigenos en las hojas o peciolas en pequeños grupos de 6 a 10, de color pardos al madurar. Los eciosoros ap...

Crece sobre *Caltha palustris*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-calthicola.html>

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

Licénido de gran tamaño, con una envergadura alar de 32 - 40 mm. El macho tiene el anverso de color azul vivo, con márgenes oscuros anchos, presentand...

En Asturias esta especie la hemos encontrado en dos tipos de hábitats muy diferentes: en prados húmedos de montaña y en zonas herbosas en lugares cálid...

Está extendida por gran parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en una franja en la zona norte que va desde Galicia a Catalu...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phengaris-arion.html>

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

El zarapito trinador es una limícola de tamaño medio - grande (unos 40 - 42 cm de longitud y 76 - 89 cm de envergadura), de aspecto similar al zarapit...



Cría en las cercanías de la costa, pero no está ligado al litoral, por lo que es posible observarlo en zonas interiores como páramos húmedos, brezales...

El zarapito trinador se reproduce en las zonas norteñas del hemisferio norte, Norteamérica, Islandia, el norte de Europa y asia; durante la invernada ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/numenius-phaeopus.html>

Carduus tenuiflorus Curtis

Planta anual o bianual, con tallos de hasta 75 cm, con una pilosidad más o menos aracnoide; el tallo está recorrido por unas alas de hasta 10 mm de an...

Crece en cardales, zonas baldías, cunetas, escombreras, en suelos nitrogenados y removidos, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud....

Aparece en el oeste de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduus-tenuiflorus.html>

Novedades corológicas

Hysteronaevia olivacea (Mouton) Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 28/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hysteronaevia-olivacea-mouton-nannf-1/9555.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mycenastrum corium (Guers.) Desv. (Basidiomycota)

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. (Magnoliophyta)

Setina flavicans (Arthropoda)

Valeriana officinalis subsp. *officinalis* L. (Magnoliophyta)

