



Num. 282. Publicado el 23/08/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hygrocybe psittacina*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 282. Publicado el 23/08/2010

Descripciones de especies

Utricularia minor L.

Planta perenne acuática o subacuática, con tallos estoloníferos filiformes, glabros y más o menos dimorfos. Los flotantes tienen los órganos foliares ...

Crece en turberas y lagunas, especialmente de alta montaña, sobre sustratos ácidos, desde los 800 a los 2300 m de altitud. Las plantas del género Utric...

Es una especie circumboreal, dispersa por la mitad septentrional de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/utricularia-minor.html>

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

Planta herbácea anual o perenne, de 5 a 15 cm, con tallos de pelosos a subglabros que surgen de una cepa gruesa y carnosa; las ramas son frágiles. Las...

Crece en paredones verticales o extraplomos y muros calizos, en zonas nitrófilas, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud...

Aparece en los Pirineos, Península Ibérica y Marruecos (Rif). En la Península es posible observarla en el centro, este y sur...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sarcocapnos-enneaphylla.html>

Lopinga achine (Scopoli, 1763)

Mariposa con una envergadura alar de 42 - 52 mm. El macho tiene el anverso de color marrón, con una hilera en cada ala de grandes ocelos ovalados oscu...

Vive en márgenes de caminos, zonas herbosas en claros de bosque y prados húmedos cercanos a zonas boscosas, desde 200 hasta más de 1000 metros. Vuela ...

Está extendida por parte del sur y gran parte del centro de Europa hasta Japón. En la Península Ibérica está presente en muy escasos puntos del norte,...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lopinga-achine.html>

Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta



Hongo que forma un micelio sobre os tallos y hojas, tanto en el haz como en el envés, efuso o formando parches, irregular, con hifas rectas o flexuosa...

Es un hongo muy común sobre diferentes especies de compuestas...

Circumglobal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/golovinomyces-cichoracearum.html>

Euepixylon udum (Pers.) Læssøe & Spooner

Macroscopía: estromas negruzcos de hasta 10 mm de longitud inmersos o semiinmersos en la madera, con aspecto clypeoide ya que sólo se encuentran engr...

Crece en la madera semipodrida de *Quercus*, rara vez *Corylus* o *Acer*...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euepixylon-udum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cicindela hybrida (Arthropoda)

Pezoloma marchantiae (Sommerf.) Benkert (Ascomycota)

Pollia dorbignyi (Mollusca)

