



Num. 285. Publicado el 13/09/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rumex suffruticosus*. Por César Fernández González



Num. 285. Publicado el 13/09/2010

Descripciones de especies

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Saltamontes de gran tamaño, que alcanza 28 - 42 mm de longitud. Ocasionalmente puede ser de color marrón, pero lo habitual es que sea de color verde, ...

Aparece en bosques de ribera, landas, zarzales, bojedales, bordes herbosos de bosques húmedos, prados, pastizales húmedos y subhúmedos, prados de sieg...

Eurasia y norte de África....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tettigonia-viridissima.html>

Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk.

Planta herbácea dioica, sufruticosa y glabra, con una cepa leñosa y tortuosa de la que surgen tallos de hasta 40 cm, ascendentes o erectos, leñosos, r...

Crece en gleras, canchales y suelos pedregosos del piso montano y subalpino, sobre sustrato silíceo, desde los 1400 a 2400 m de altitud....

Es una planta endémica de las montañas del centro, norte y NO de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-suffruticosus.html>

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

Planta herbácea perenne, con 2 tubérculos sésiles o uno de ellos algo pedunculado, con el tallo frágil y delgado de color verdoso. Las hojas, entre 3 ...

Crece en claros de diferentes tipos de bosques, como pinares, encinares, alcornocales, melojares, en formaciones arbustivas, dunas consolidadas y past...

Aparece en Irlanda, Macaronesia y región mediterránea, desde el S de Francia y el NO de África hasta el O de Anatolia y Palestina. En la Península est...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neotinea-maculata.html>

Erysiphe trifolii Grev. 1824



Hongo que forma un micelio sobre las hojas, en el haz o en el envés, efuso o parcheado, que a menudo cubre la superficie completa de la hoja. Está for...

Es un hongo que parasita numerosas especies de leguminosas....

Aparece en Europa, Asia, el norte de África y América, y ha sido introducido en Australia, Nueva Zelanda, el sur de África y el sur de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-trifolii-.html>

Agriades pyrenaicus Boisduval, 1840

El macho tiene el anverso de color gris plateado muy claro, con márgenes oscuros finos, y con un estrecho punto discoidal negro en ambas alas; el reve...

Vive en laderas herbosas, preferentemente en zonas calizas, desde 1.300 a más de 2.000 metros. Vuela de junio a finales de agosto, en una generación a...

Está extendida por el norte de la Península Ibérica, Francia y los Balcanes hasta el Cáucaso. En la Península vuela exclusivamente en los Pirineos y e...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agriades-pyrenaicus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abutilon theophrasti Medik. (Magnoliophyta)

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray (Ascomycota)

Monilinia fructigena Honey (Ascomycota)

Neoerysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun (Ascomycota)

Platycoleis albopunctata (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Polygonum capitatum Buch.-Ham. (Magnoliophyta)

Puccinia pulverulenta Grev. (Basidiomycota)

