



## Num. 286. Publicado el 20/09/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Capitotricha fagiseda*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 286. Publicado el 20/09/2010**

## Descripciones de especies

*Zygaena contaminei* Boisduval, 1834

Mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de 28 mm. Los imagos son de tamaño mediano, con el color dominante de las alas en negro azulado y que...

Vive en zonas de vegetación baja, terrenos abiertos y bosques claros desde julio y agosto, en una generación, desde los 1000 a los 2000 metros. Los im...

Restringida a algunas zonas de España (centro, vertiente cantábrica y Pirineos), llegando hasta Austria....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zygaena-contaminei.html>

*Physospermum cornubiense* (L.) DC.

Planta herbácea perenne, casi glabra, con tallos de 30 a 150 cm, sólidos, estriados o algo asurcados, no ramificados excepto en la parte superior. Las ...

Crece en bosques caducifolios y brezales sobre sustrato ácido, desde los 90 a los 1800 m de altitud....

Aparece en el sur, centro y oeste de Europa y en el SO de Asia. En la Península, principalmente en el cuadrante NO....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/physospermum-cornubiense.html>

*Dencoeliopsis johnstonii* (Berk.) Korf

Macroscopía: Ascomas gregarios, superficiales, cupuliformes, de hasta 5 mm de altura y 4 mm de anchura, soportados por un corto y ancho pseudoestípite...

Los ascomas estudiados crecían con abundancia sobre los agudos estromas negruzcos de un pyrenomycete muerto que clásicamente la literatura relaciona c...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dencoeliopsis-johnstonii.html>

*Cyrtaspis scutata* (Charpentier, 1825)

Saltamontes de 13-20 mm de longitud, de color verde o marrón claros, habitualmente con diminutas motas amarillas. Pronoto de gran tamaño, que se prolo...



Presente en bosques de ribera y encinares húmedos, desde el nivel del mar a los 900 m. Los adultos se pueden observar entre julio y octubre. En Asturia...

Europa meridional y norte de África....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyrtaspis-scutata.html>

## *Asperula hirta* Ramond

Planta herbácea perenne, con varios tallos que la hacen muy cespitosa, que surgen de estolones subterráneos rojizos o pardo anaranjados. Los tallos, d...

Crece en fisuras de roquedos, repisas y en crestones calizos, en matorrales y pastos subalpinos, desde los 1100 hasta los 2600 m de altitud....

Aparece en el norte de España (Cordillera Cantábrica y Pirineos) y en el sur de Francia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asperula-hirta.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aellopus atratus* (Arthropoda)

*Hericium erinaceus* (Bull.) Pers. (Basidiomycota)

*Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757) (Arthropoda)

*Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757) (Arthropoda)

*Xerocomus ripariellus* Redeuilh (Basidiomycota)

