



Num. 292. Publicado el 01/11/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Senecio adonidifolius*. Por José Luis Porto Torres



Num. 292. Publicado el 01/11/2010

Descripciones de especies

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Saltamontes de cuerpo estrecho y alargado que alcanza tallas de 20-33 mm, con un aspecto ahusado inconfundible, de color verde o marrón, aunque el pri...

Aparece en bosques de ribera, cañaverales, pastizales húmedos y subhúmedos, juncales, herbazales de ribera y pastizales de marisma, desde el nivel del...

Europa meridional y norte de África. Es una especie extremadamente común en Asturias, siendo uno de los saltamontes más grandes que se pueden observar...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ruspolia-nitidula.html>

Rickenella mellea (Singer & Clem.) Lamoure

Macroscopía: hongo que forma basidiomas omphalinoideos y gregarios con sombreros convexos y umbilicados de hasta 8 mm de diámetro, higrófanos, estriado...

Crece sobre los musgos presentes en zonas turbosas....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rickenella-mellea.html>

Peziza vesiculosa Bull.

Macroscopía: ascomas gregarios, en ocasiones confluyentes al crecer en grupos apretados, sésiles y profundamente cupuliformes, de tamaño grande para e...

Esta hongo prefiere los suelos nitrogenados con presencia de estiércol y restos vegetales....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peziza-vesiculosa.html>

Monotropia hypopitys L.

Planta parásita de color amarillento o blanquecino, sin clorofila, provista de un rizoma carnoso que está cubierto por una maraña de micorrizas. Los t...

Crece en bosques húmedos, especialmente en los hayedos y pinares, sobre el mantillo, asociada a los hongos que lo descomponen, desde los 350 a



los 190...

Aparece en toda Europa, siendo más escasa en la región mediterránea, en Asia, el norte de África y el norte de América. En la Península es más común e...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/monotropa-hypopitys.html>

Erysiphe necator Schwein. 1834

El oídio de la vid es uno de los hongos más importantes por el grave daño que causa a las vides. Forma un micelio blanquecino en los frutos y hojas, t...

Es un hongo parásito de la vid, que ataca por tanto especies del género *Vitis*, como *Vitis vinifera*...

Se trata de una especie originaria de Norte América que fue introducida en Europa, donde fue descrita en 1845 por primera vez en su fase asexual, prod...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-necator.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amaurobius similis (Blackwall, 1861) (Arthropoda)

