



Num. 297. Publicado el 06/12/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Epilobium parviflorum*. Por César Fernández González



Num. 297. Publicado el 06/12/2010

Descripciones de especies

Verbascum lychnitis L.

Planta herbácea anual, perenne en ocasiones, y pubescente. Sus tallos, de 50 a 150 cm, son claramente angulosos, en ocasiones robustos, muy ramificado...

Crece en bordes de prados, pastos majadeados, reposaderos de ganado, márgenes de pistas, cunetas, ribazos, taludes y yermos, desde los 350 a los 1750 ...

Aparece en Europa pero está excluida de su parte septentrional, desde la Península Ibérica y el sur de Inglaterra hasta el centro y sur de Rusia, más...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-lychnitis.html>

Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.

Macroscopía: ascomycete que forma peritecios gregarios, simples, subsféricos, de hasta 1 mm de anchura y altura, de color pardo-negruzco, consistenc...

Crece sobre madera....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-necatrix.html>

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Saltamontes cuyo cuerpo mide de 12 a 18 milímetros. Sus antenas son hasta cuatro veces mayores que el cuerpo. Los lóbulos del pronoto son un poco más ...

Es una especie propia de zonas arbustivas. Se la puede encontrar desde el nivel del mar hasta por encima de los 1200 metros (Olmo Vidal, 2002). Es una ...

Se distribuye en torno al Mar Mediterráneo en Europa; Irán, sur de Rusia, este de China y Corea....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phaneroptera-falcata.html>

Cortinarius dionysae Rob. Henry

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 4 - 10 cm de diámetro, al principio hemisférico, luego de convexo a aplanado, ligeramente deprimido o umbon...



Crece tanto bajo planifolios como coníferas durante el otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-dionysae.html>

Cantharellus tubaeformis Fr.

Macroscopía. Fructificaciones estipitadas y gregarias, con un sombrero de 2 a 6 cm de diámetro, plano o infundibuliforme, con el centro umbilicado, de...

Crece generalmente bajo coníferas, pero también donde aparecen planifolios, en suelos generalmente musgosos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cantharellus-tubaeformis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arachnopeziza obtusipila Gelet (Ascomycota)

Galerina clavus Romagn. (Basidiomycota)

Gymnopilus arenophilus A. Ortega & Esteve-Rav. (Basidiomycota)

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Arthropoda)

Polistes biglumis (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008