



**Num. 298. Publicado el 13/12/2010**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Boudiera tracheia*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 298. Publicado el 13/12/2010**

## Descripciones de especies

### *Peziza saccardiana* Cooke

Macroscopía: ascomas gregarios, cupuliformes y sésiles de hasta 3 cm de diámetro. Himenio de color pardo-rojizo, con reflejos verdosos en la juventud ...

Vive en el suelo de los bosques, a veces sobre restos carbonizados....

Especie de apetencias por climas mediterráneos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peziza-saccardiana.html>

### *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood

Planta anual, con tallos de entre 10 y 45 cm, glabros o escábrido - pubescentes, con hojas opuestas de 12 - 45 x 0.5 - 1.5 mm, lineares, con el margen...

Crece sobre suelos arenosos y substratos de tipo ácido o neutro, en ambientes algo ruderalizados, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud...

Aparece en el O de Europa y NO de África, dudosamente nativa en Canarias, Madeira e islas del Canal de la Mancha; introducida de forma local en Austra...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/petrorhagia-nanteuilii.html>

### *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de entre 42 y 45 mm, muy polimorfa. El macho tiene el anverso ajedrezado de color blanquecino y negro. La celda del ...

Vive en prados, zonas abiertas y márgenes de caminos, desde el nivel del mar hasta 1600 metros. Vuela de mayo a septiembre, en una generación al año. ...

Está extendida por el noroeste de África y Europa hasta el Cáucaso. En la Península Ibérica está presente en una franja a lo largo de la zona norte, d...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-galathea.html>

### *Lycoperdon lividum* Pers.



Macroscopía. Basidiomas de elípticos a piriformes, de 15 a 25 mm de alto y hasta 3 cm de diámetro, bruscamente contraído en un pie pequeño, corto y có...

Crece de forma solitaria o gregaria en pastos, bosques, prados, principalmente en dunas y zonas herbosas secas en ambientes cálidos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-lividum.html>

*Elaphocordyceps capitata* (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora

Macroscopía. Hongo parásito que forma fructificaciones divididas en una cabeza fértil y un pie estéril. La primera es más o menos esférica, de 6 - 10 ...

Crece parasitando especies de hongos del género *Elaphomyces*, que crecen enterrados en el suelo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elaphocordyceps-capitata.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aricia morronensis* (Ribbe, 1910) (Arthropoda)

*Striarca lactea* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Talochlamys pusio* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

