



Num. 300. Publicado el 27/12/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Psathyrella olympiana*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 300. Publicado el 27/12/2010

Descripciones de especies

Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf & J. R. Dixon

Macroscopía: ascomas de hasta 2-3 mm de diámetro, sésiles o soportados por un grueso y corto estípite negruzco de igual color que el excípulo. El hime...

Es un hongo muy común durante el periodo estival en los pisos colino y montano. Los ascomycetes que pertenecen a este género muestran una gran afinidad...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vibrissea-flavovirens.html>

Russula nigricans Fr.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 5 a 20 cm de diámetro, carnoso, duro, al principio globoso, luego plano convexo y finalmente depr...

Es una especie muy común, que crece tanto en bosques de coníferas como caducifolios...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-nigricans.html>

Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)

Licénido de pequeño tamaño, con una envergadura alar de 20 - 24 mm. El macho tiene el anverso de color violeta claro, con márgenes oscuros estrechos y...

Vive en brezales y zonas de monte bajo, con preferencia por los biotopos secos, desde el nivel del mar a 1.700 metros. Vuela desde abril a septiembre...

Aparece por el norte de la Península Ibérica y sur y centro de Europa. Según los últimos estudios, y en rasgos generales, en la Península Pseudophilot...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudophilotes-baton.html>

Galeopsis tetrahit L.

Planta herbácea de hasta 130 cm, anual, con tallos ramificados erectos, cuadrangulares, con los nudos engrosados, con unos pelos rígidos ásperos, pate...



Crece en pastos, setos y orlas de bosques, en zonas frescas y algo umbrosas, nitrófilas y alteradas; aunque es una planta indiferente edáfica, prefier...

Aparece en toda Europa, siendo más escasa hacia el SE, en la mayor parte de Asia; introducida en Norteamérica. En la Península es frecuente en el terc...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-tetrahit.html>

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758

El jilguero es un conocido pájaro que mide unos 12 cm de longitud y 21 - 25.5 cm de envergadura. Sus vistosos colores lo hace fácil de identificar, es...

El jilguero se establece en un gran número de hábitats, siempre que exista una notoria cobertura arbórea y el clima sea suave, por lo que no suele encon...

Aparece en toda Europa, excepto en el norte y centro de Escandinavia. En Asia alcanza Mongolia y Arabia Saudí. Aparece también en el norte de África y...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-carduelis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cingula trifasciata (Adams J., 1800) (Mollusca)

Ensis ensis (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Gari fervensis (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Idotea balthica (Pallas, 1772) (Arthropoda)

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

