



Num. 301. Publicado el 03/01/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Atropa belladonna*. Por José Luis Porto Torres



Num. 301. Publicado el 03/01/2011

Descripciones de especies

Venus casina Linnaeus, 1758

Molusco bivalvo de hasta 5 cm, equivalvo e inequilateral, de contorno casi circular, algo truncado en el margen posterior. El ligamento se extiende ha...

Vive en sustratos de arena, grava u otras conchas, desde el sublitoral hasta el borde de la plataforma continental...

Desde el sur de Noruega a la Península Ibérica y Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venus-casina.html>

Hysteronaevia olivacea (Mouton) Nannf.

Macroscopía: ascomas dispersos de hasta 0,25 mm de diámetro, inicialmente inmersos, errumpentes más tarde pero formando desgajamientos en la epidermis...

Crece en las hojas muertas de plantas de la familia Cyperaceae....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hysteronaevia-olivacea.html>

Hypericum humifusum L.

Planta herbácea perenne, raramente anual, glabra, de 4 a 30 cm, con una cepa pequeña, apenas lignificada, con varios tallos que sólo se ramifican en e...

Crece en prados húmedos, suelos temporalmente encharcados, brezales, orlas de bosque, taludes, etc., principalmente en sustrato ácido, desde los 75 a...

Aparece en el oeste y centro de Europa, hasta el C de Italia yAlbania, el NO de África y Macaronesia. En la Peninsula es frecuente en la mitad oeste...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-humifusum.html>

Clavicornona taxophila (Thom) Doty

Macroscopía: basidiomas dispersos, estrechamente turbinados, cantharelloides, truncados en el ápice, no ramificados y completamente blancos de hasta 2...



Es un hongo saprófito de restos vegetales, lignificados o no, de coníferas y planifolios. ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavicornona-taxophila.html>

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 38 - 46 mm, polimorfa. El macho tiene el anverso de color pardo muy oscuro, con ocelos oscuros y pequeños en amba...

Vive en setos, claros de bosque y prados húmedos, desde zonas bajas hasta 1500 metros....

Está extendida por toda Europa hasta Corea. En la Península Ibérica está presente en su mitad septentrional. En Asturias está extendida a lo largo del...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphantopus-hyperantus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) (Mollusca)

Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872) (Mollusca)

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Scopula floslactata Haworth 1809 (Arthropoda)

Stenotus binotatus (Arthropoda)

Tephroclybe anthracophila (Lasch) P. D. Orton (Basidiomycota)

