



Num. 303. Publicado el 17/01/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 303. Publicado el 17/01/2011

Descripciones de especies

Puccinia antirrhini Dietel & Holw.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros parduscos en el envés de las hojas; sus uredosporas son de elípticas a globosas, de 23 - 30 x 21 - 25 µm...

Crece sobre especies del género *Antirrhinum*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-antirrhini.html>

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)

Mariposa con una envergadura alar de 26 - 34 mm, polimorfa. El macho tiene el anverso de color violeta con finos márgenes negros. El reverso es marrón...

Vive en laderas floridas, praderas, brezales y zonas de matorral, normalmente en montañas calizas desde 1000 hasta más de 2000 metros, aunque en los P...

Está extendida por Europa, Asia y Norteamérica. En la Península Ibérica es más común en la zona norte, volando también en sistemas montañosos del cent...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plebejus-idas.html>

Mollisia pilosa (Crossl.) Baral & T. Richter

Macroscopía: ascomas dispersos de hasta 2 mm de diámetro, anchamente sésiles y brevemente cupuliformes, con el himenio, de color gris o gris azulado, ...

Ascomycete propio de lugares semiencharcados, que vive de manera saprófita sobre tallos muertos de *Typha*, *Iris* y otras monocotiledóneas....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-pilosa.html>

Luzula pediformis DC.

Planta herbácea perenne de 20 - 50 cm, sin estolones pero con un rizoma oblicuo, lignificado, frecuentemente cubierto por los restos fibrosos y coriác...

Crece en pastos montanos y subalpinos, sobre sustratos de areniscas, cuarcitas, calizas o pizarras, desde los 1500 a los 2500 m de altitud. ...



Aparece en los Alpes, Pirineos y montañas de la Península Ibérica (desde la sierra de los Ancares hasta el Pirineo oriental, sierra de Guadarrama y Co...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/luzula-pediformis.html>

Balea perversa (Linnaeus, 1758)

Molusco con una concha pequeña, de 7 - 10 x 2.2 - 2.5 mm, de color pardo claro, a menudo brillante y sedosa, con pequeñas costillas a menudo marcadas....

Vive entre musgos y en la corteza de los árboles, paredes, pendientes pedregosas húmedas, a menudo sobre superficies incrustadas con líquenes y otros ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balea-perversa.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

Tephroclype atrata (L.) Donk (Basidiomycota)

