



Num. 307. Publicado el 14/02/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lathyrus latifolius*. Por José Luis Porto Torres



Num. 307. Publicado el 14/02/2011

Descripciones de especies

Whalleya microplaca (Berk. & Br.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & F. San Martín

Macroscopía: estromas cortícolas, aplanados, irregularmente elipsoides, de 5-8 mm longitud x 2-4 mm de anchura y 0.4 mm de grosor; gruesos, más delgad...

Es un hongo que parece estar ligado a plantas de la familia Lauraceae....

Cosmopolita. Citado anteriormente en Canarias, esta cita es la primera de Europa continental....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/whalleya-microplaca.html>

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)

Mariposa con una envergadura alar de 22 - 26 mm. El macho tiene el anverso de color muy oscuro, con puntos blancos pequeños en ambas alas, y con una s...

Muestra preferencia por los lugares cálidos y secos, como zonas herbosas y secas, márgenes de caminos, zonas de monte bajo y laderas, desde 60 a 1800 m...

Está extendida por el norte de África y sur de Europa hasta Asia. Está presente en prácticamente toda la Península Ibérica, y ampliamente distribuida ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spialia-sertorius.html>

Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer

Macroscopía: sombrero de 2 - 8 cm, de color blanco, al principio de forma redondeada - espatulada o también petaloide y luego con aspecto de concha; m...

Crece formando grupos, muchas veces imbricados, con una clara apetencia por la madera de coníferas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pleurocybella-porrigens.html>

Orobanche reticulata Wallr.

Planta parásita por lo general perenne, con un tallo de hasta 35 cm, no ramificado, de color malva claro y provisto de pelos glandulíferos. Las hojas, ...



Esta planta parasita especies de Carduus y Cirsium, siendo más raro verla sobre dipsacáceas, como por ejemplo Scabiosa....

Aparece en las montañas del sur de Europa: Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-reticulata.html>

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)

Molusco de hasta 40 x 12 mm, con la concha de aspecto cónico, formada por hasta 15 vueltas de espira marcadas, de sección circular, que no tienen sutura...

Vive en el sublitoral, en sustratos arenosos o fangosos hasta los 70 m. Puede ser localizado en el intermareal en época de reproducción, durante la marea baja...

Aparece desde el Mediterráneo hasta Noruega....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epitonium-clathrus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

Harmothoe extenuata (Grube, 1840) (Annelida)

Hyphodiscus viridipilosus (Graddon) Baral (Ascomycota)

Pholcus phalangioides (Arthropoda)

Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) (Mollusca)

Tinea pellionella Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

