



Num. 308. Publicado el 21/02/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Carex sylvatica*. Por César Fernández González



Num. 308. Publicado el 21/02/2011

Descripciones de especies

Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 20 - 80 mm de diámetro, al principio hemisférico, luego convexo, cónico en ocasiones, con la superficie...

Crece en bosques de caducifolios y coníferas, entre las hojarasca....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-sulphureum.html>

Irus irus (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 25 mm, alargada, oblonga o irregular, con el umbo anterior a la línea media. Presenta una ornamentación formada...

Vive en agujeros y grietas de las rocas o en rizoides de Laminaria, en zonas no muy profundas....

Aparece desde las Islas Británicas al Mediterráneo y el oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/irus-irus.html>

Harmothoe extenuata (Grube, 1840)

Gusano poliqueto de hasta 70 mm, con un cuerpo de anchura uniforme que está cubierto por escamas; la parte dorsal y la ventral son lisas. El prostomio...

Vive en el litoral rocoso hasta los 1250 m de profundidad; en ocasiones aparece en tubos de otros poliquetos....

Aparece en el Ártico, el Pacífico Norte, el Atlántico Norte, Mediterráneo, Adriático, Mar Negro y alcanza Sudáfrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/harmothoe-extenuata.html>

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)

Mariposa con una envergadura alar de entre 40 y 46 mm. Presenta el anverso de las alas superiores de color marrón rojizo, con una amplia banda transve...

Vive en garrigas, lugares abiertos y eriales, desde el nivel del mar a medianas altitudes. Vuela de mayo a septiembre, en dos generaciones al año. Es

...



Está extendida por África, el sur y centro de Europa y Cercano Oriente. Está ampliamente extendida por la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dysgonia-algira.html>

Cirsium pannonicum (L. f.) Link

Hierba perenne, rizomatosa, sin raíces tuberosas, espinulosa, más o menos pelosa. Tallos 30-80 cm, por lo general simples, rara vez ramificados, alad...

Crece en zonas herbosas entre los 900 y 1500 m de altitud....

Aparece en Europa central, el norte de Italia y el norte de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-pannonicum.html>

Novedades corológicas

Sarea resinae (Fr.) Kuntze (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Alto de la Casa del Puerto, Tineo. ASTURIAS el día 14/02/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/sarea-resinae-fr-kuntze-1/10545.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) (Mollusca)

Sarea resinae (Fr.) Kuntze (Ascomycota)

Tectura virginea (Müller O.F. 1776) (Mollusca)

Tellina tenuis da Costa, 1778 (Mollusca)

