



## Num. 311. Publicado el 14/03/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Flammulina velutipes*. Por César Fernández González



**Num. 311. Publicado el 14/03/2011**

## Descripciones de especies

*Tetrastemma fozensis* Gibson & Junoy, 1991

Gusano filiforme que puede alcanzar hasta 10 mm de longitud y 0,6 mm de anchura máxima. La anchura del cuerpo es más o menos uniforme a lo largo del c...

Esta especie se encuentra como simbiote dentro del manto de *Scrobicularia plana* (da Costa). García-Pérez y Anadón (2004) describieron que a lo largo...

La localidad típica de *T. fozensis* es Ría de Foz (Galicia). También ha sido encontrada en el estuario de Villaviciosa (García-Pérez y Anadón, 2004) y ...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tetrastemma-fozensis.html>

*Talitrus saltator* (Montagu, 1808)

La pulga de mar es un animal muy activo, que alcanza los 20 - 25 mm de longitud y de color pardo grisáceo. Tiene un cuerpo comprimido dorso-lateralmen...

Es muy fácil observar pulgas de mar entre los restos de algas y materiales depositados por las mareas en el supralitoral. A medida que la luz se intens...

Aparece en el Atlántico NE. Es abundante a lo largo de la costa europea entre el sur de Noruega y Mediterráneo oriental, y también en las Azores....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/talitrus-saltator.html>

*Scrobicularia plana* (da Costa, 1778)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 65 mm, fina y frágil, de contorno ovalado, con los umbos anteriores a la línea media. La ornamentación consist...

Vive en el intermareal, enterrado en el sustrato en zonas de mareas en lugares de salinidad variable, como rías y estuarios....

Ampliamente distribuido desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrobicularia-plana.html>

*Reichardia picroides* (L.) Roth



Hierba perenne hasta de 60 cm, caulescente, a veces escapiforme, glabrescente. Tallos herbáceos, leñosos en la base, erectos, foliosos, a veces escapi...

Acantilados marítimos, baldíos, taludes y roquedos, en sustratos muy variados -arenas, calizas, margas, pizarras y esquistos-; 0-1260 m....

Región Mediterránea y Macaronesia (Azores y Canarias). Casi todas las provincias costeras de la Península Ibérica, aunque falta o escasea en el NW. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-picroides.html>

## *Puccinia gentianae* (F. Strauss) Link

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo se forman las siguientes fases: Picnidios en pequeños grupos o esparcidos entre los eciosoros, de color meloso. Eciosor...

Crece sobre diversas especies de *Gentiana*, como *Gentiana pneumonanthe* y *Gentiana lutea* subsp. *lutea*....

Se ha citado en la Península Ibérica en Sierra Nevada, Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, J. L.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-gentianae.html>

## **Novedades corológicas**

### *Lophiostoma nucula* (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 07/03/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-nucula-fr-ces-de-not-1/10628.html>

### *Scytinostroma hemidichophyticum* Pouzar (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 07/03/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/scytinostroma-hemidichophyticum-pouzar-1/10625.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Cerithiopsis tubercularis* (Montagu, 1803) (Mollusca)

### *Gibbula cineraria* (Linneo, 1758) (Mollusca)

### *Hyalopsora adianti-capilli-veneris* (DC.) Syd. (Basidiomycota)



*Libelloides hispanicus* (Rambur, 1842) (Arthropoda)

*Lophiostoma nucula* (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

*Radix balthica* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Scrobicularia plana* (da Costa, 1778) (Mollusca)

*Tetrastemma fozensis* Gibson & Junoy, 1991 (Nemertea)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008