



Num. 311. Publicado el 14/03/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Flammulina velutipes*. Por César Fernández González



Num. 311. Publicado el 14/03/2011

Descripciones de especies

Tetrastemma fozensis Gibson & Junoy, 1991

Gusano filiforme que puede alcanzar hasta 10 mm de longitud y 0,6 mm de anchura máxima. La anchura del cuerpo es más o menos uniforme a lo largo del c...

Esta especie se encuentra como simbiote dentro del manto de *Scrobicularia plana* (da Costa). García-Pérez y Anadón (2004) describieron que a lo largo...

La localidad típica de *T. fozensis* es Ría de Foz (Galicia). También ha sido encontrada en el estuario de Villaviciosa (García-Pérez y Anadón, 2004) y ...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tetrastemma-fozensis.html>

Talitrus saltator (Montagu, 1808)

La pulga de mar es un animal muy activo, que alcanza los 20 - 25 mm de longitud y de color pardo grisáceo. Tiene un cuerpo comprimido dorso-lateralmen...

Es muy fácil observar pulgas de mar entre los restos de algas y materiales depositados por las mareas en el supralitoral. A medida que la luz se intens...

Aparece en el Atlántico NE. Es abundante a lo largo de la costa europea entre el sur de Noruega y Mediterráneo oriental, y también en las Azores....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/talitrus-saltator.html>

Scrobicularia plana (da Costa, 1778)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 65 mm, fina y frágil, de contorno ovalado, con los umbos anteriores a la línea media. La ornamentación consist...

Vive en el intermareal, enterrado en el sustrato en zonas de mareas en lugares de salinidad variable, como rías y estuarios....

Ampliamente distribuido desde Noruega al Mediterráneo y el oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrobicularia-plana.html>

Reichardia picroides (L.) Roth



Planta herbácea perenne, acaule o con tallos de hasta 60 cm. Las hojas lisas o más o menos papilosas; las basales de 2 - 13 x 0.5 - 2.5 cm, de forma o...

Crece en repisas herbosas de acantilados costeros, en herbazales de claros forestales y prados pedregosos, desde el nivel del mar a los 1000 m de alti...

Aparece en el sur de Europa, en la cuenca mediterránea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reichardia-picroides.html>

Puccinia gentianae (F. Strauss) Link

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo se forman las siguientes fases: Picnidios en pequeños grupos o esparcidos entre los eciosoros, de color meloso. Eciosor...

Crece sobre diversas especies de Gentiana, como *Gentiana pneumonanthe* y *Gentiana lutea* subsp. *lutea*....

Se ha citado en la Península Ibérica en Sierra Nevada, Pirineos y la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-gentianae.html>

Novedades corológicas

Lophiostoma nucula (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 07/03/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-nucula-fr-ces-de-not-1/10628.html>

Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. ASTURIAS el día 07/03/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/scytinostroma-hemidichophyticum-pouzar-1/10625.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) (Mollusca)

Gibbula cineraria (Linneo, 1758) (Mollusca)

Hyalopsora adianti-capilli-veneris (DC.) Syd. (Basidiomycota)



Libelloides hispanicus (Rambur, 1842) (Arthropoda)

Lophiostoma nucula (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Radix balthica (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Scrobicularia plana (da Costa, 1778) (Mollusca)

Tetrastemma fozensis Gibson & Junoy, 1991 (Nemertina)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008