



## Num. 317. Publicado el 25/04/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Haliotis tuberculata*. Por César Fernández González



**Num. 317. Publicado el 25/04/2011**

## Descripciones de especies

*Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm.

Macroscopía: hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 40 a 130 mm de diámetro, de forma al principio cónico - campanulado para hacerse de co...

Crece solitario o en grupos en troncos muertos de planifolios desde la primavera al otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pluteus-cervinus.html>

*Isatis tinctoria* L.

Planta herbácea anual, de hasta 120 cm, glabra o pubescente. Tiene hojas basales arrosetadas, de hasta 24 x 6 cm, de forma obovado - oblonga, atenuada...

Es una planta ruderal y arvense que crece preferentemente sobre suelos básicos, si bien es capaz de crecer sobre arenas silíceas, desde los 500 a los ...

Aparece en la Región mediterránea, Europa central y SW de Asia, y se ha introducido en otras partes de Europa y Asia, así como en el N y S de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/isatis-tinctoria.html>

*Gari costulata* (Turton, 1822)

Concha de hasta 25 mm de longitud, fina, oval elongada, con los umbos posteriores a la línea media. La parte anterior de la línea de charnela presenta...

Vive en arena fangosa y en el mar pero no a grandes profundidades....

Ampliamente distribuido pero no común, desde el Mediterráneo al oeste de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gari-costulata.html>

*Emplectonema echinoderma* (Marion, 1873)

Gusano filiforme de hasta 20 cm de longitud con grosor de 1-1,5 mm en la parte anterior y hasta 2-5 mm en la parte intestinal. La cabeza es espatulada...



Puede encontrarse desde la zona litoral media al intermareal somero, entre arena, bajo piedras, en fisuras de rocas y entre Zostera. ...

Se conoce desde las Islas Británicas al Mediterráneo. En Asturias, esta especie ha sido citada por primera vez por Vernet y Anadón (1991)...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/emplectonema-echinoderma.html>

*Ascobolus albidus* P. Crouan & H. Crouan

Macroscopía. Fructificaciones dispersas o gregarias, superficiales, sésiles, con una base estrecha, de hasta 1 mm de diámetro y 0.8 mm de altura. El r...

Crece en excrementos de vaca, caballo, ovejas, cabras, perros, lobos,.....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-albidus.html>

## **Novedades corológicas**

*Melanconis flavovirens* (G.H. Otth) Wehm. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 23/04/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconis-flavovirens-g-h-otth-wehm-1/10841.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ancylus fluviatilis* Müller, 1774 (Mollusca)

*Megabunus diadema* (Fabricius, 1779) (Arthropoda)

*Melanconis flavovirens* (G.H. Otth) Wehm. (Ascomycota)

*Mollisia melaleuca* (Fr.) Sacc. (Ascomycota)

*Ocinebrina edwardsii* (Payraudeau, 1826) (Mollusca)

*Ophion luteus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Ophrys speculum* Link (Magnoliophyta)

*Orchis morio* L. (Magnoliophyta)

