



Num. 32. Publicado el 18/07/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lolium multiflorum*. Por César Fernández González



Num. 32. Publicado el 18/07/2005

Descripciones de especies

Turritella communis Risso, 1826

Concha cónica, estrecha y alta, puntiaguda, que puede llegar a 6 cm de longitud. Tiene unas 20 vueltas de espira, cada una con 3 - 6 crestas o costill...

Enterrada parcialmente en arena o fango, a veces presente entre algas filtrando. Hasta los 200 m de profundidad. A veces es posible observar gran núme...

Desde Noruega al Mediterráneo, ausente en el Canal de la Mancha....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/turritella-communis.html>

Pomatoschistus pictus

Góbido de cuerpo robusto, alargado, que tan sólo llega a 9 o 10 cm de longitud. Carece de escamas en el dorso hasta el final de la primera aleta dorsa...

Hasta los 50 m, en fondos de arena o grava....

De Noruega a Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pomatoschistus-pictus.html>

Gobius cruentatus (Gmelin, 1789)

Al igual que otros góbidos, cuerpo alargado, robusto y cilíndrico. Alcanza los 18 cm de longitud. Presenta escamas en la mejilla y el opérculo, y un t...

Vive entre 10 y 40 m de profundidad, en fondos de arena y fango, con bloques de piedra, escondiéndose en las grietas de los mismos. Se alimenta de cru...

Desde el sur de las Islas Británicas a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gobius-cruentatus.html>

Gobius cobitis Pallas, 1814

El mayor de los góbidos, puede alcanzar los 27 cm de longitud. Su cuerpo es alargado, robusto, cilíndrico. La narina anterior tiene un tentáculo más



o...

Entre 2 y 10 m de profundidad, en fondos rocosos, a veces fácil de encontrar en charcas de mareas. Se alimenta de invertebrados como crustáceos y poli...

Desde el SO de las Islas Británicas al Mar Negro y canal de Suez....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gobius-cobitis.html>

Drachiella spectabilis

Alga fijada al sustrato por unos rizoides pequeños de los que surge una corta estipe cilíndrica, algo aplanada, de tan solo 1 cm de longitud. La lámin...

Sublitoral hasta 30 m de profundidad, sobre rocas, generalmente en bosques de kelps....

Desde las Islas Británicas al Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/drachiella-spectabilis.html>

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758)

Molusco de concha ovalada, de 25 mm de alto y hasta 50 de largo. Tan sólo tiene 2 vueltas de espira, siendo éstas poco aparentes. La superficie es lis...

Vive en aguas poco profundas, sobre conchas o piedras. Los individuos forman largas cadenas de hasta 12 ejemplares, de los cuales el inferior es de ma...

Aparece desde Noruega al Mediterráneo. Especie originaria de las costas de Norteamérica ha sido introducida en Europa con cultivos de la ostra Crassos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crepidula-fornicata.html>

Cirratulus cirratus

Gusano de hasta 12 cm de longitud, de cuerpo delgado formado por 75 - 130 segmentos. La cabeza es indistinta, semejante al resto de los segmentos pero...

En arena o barro entre bloques, enterrado, siendo tan sólo visibles los tentáculos que surgen de la arena. Es menos frecuente en grietas....

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cirratulus-cirratus.html>

Calliactis parasitica Couch, 1842

Anémona de 8 cm de alto y 5 cm de diámetro, con base bastante adherente. Columna lisa, con pequeños agujeros en la base por los que salen pequeños fil...

Generalmente se encuentra asociada a conchas de gasterópodos como *Buccinum undatum* que son ocupadas por cangrejos ermitaños, como *Pagurus bernhardus*. ...

Desde Gales al Mediterráneo....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calliactis-parasitica.html>

Actinia fragacea Tugwell, 1856

Anémona similar a *Actinia equina*, pero de mayor tamaño, ya que llega a alcanzar los 10 cm de longitud. La columna es lisa, con 5 o 6 filas de tentáculos...

Bastante común, en rocas, bloques, grietas y salientes desde el mediolitoral hasta los 8 - 10 m, preferentemente en lugares verticales, ya sean expues...

Desde el norte de Noruega hasta África, incluyendo las Azores, Canarias, Cabo Verde y el Mediterráneo....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/actinia-fragacea.html>

