



Num. 322. Publicado el 30/05/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Acacia longifolia*. Por César Fernández González



Num. 322. Publicado el 30/05/2011

Descripciones de especies

Teucrium fruticans L.

Arbusto de 50 - 150(200) cm, muy ramificado, voluminoso, frecuentemente ginodioico. Tallos erectos, foliosos, cuadrangulares; los jóvenes herbáceos, g...

Crece en matorrales heliófilos, claros de encinar, de alcornocal o de pinares, roquedos en substrato calizo o silíceo; desde el nivel del mar a los 1...

Aparece en la Región mediterránea occidental, S de Italia, Sicilia y N de África, en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Centro y sur de la Península I...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-fruticans.html>

Puncturella noachina (Linnaeus, 1771)

Molusco gasterópodo de hasta 7 x 5 x 4 mm, con la concha con forma de sombrero que presenta un pico recurvado que termina en una pequeña espira de has...

Aparece en el intermareal rocoso hasta los 165 m de profundidad, especialmente en zonas ricas en esponjas. Generalmente vive en grupos y se alimenta d...

Circumpolar, que alcanza el sur de Portugal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puncturella-noachina.html>

Psilachnum lanceolotoparaphysatum (Rehm) Höhn.

Macroscopía: ascomas gregarios y sésiles de hasta 1 mm de diámetro, con el himenio de color amarillo pálido u ocre amarillento. Margen provisto de con...

Crece en tallos herbáceos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/psilachnum-lanceolotoparaphysatum.html>

Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat.

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, plano convexo al principio, luego algo deprimido en el centro ...



Vive en zonas herbosas, jardines, bordes de camino, pastos, siendo una especie frecuente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanoleuca-brevipes.html>

Erebia gorgone (Boisduval, 1833)

Mariposa con una envergadura alar de 20 - 21 mm. Es de color de fondo marrón oscuro. Tiene bandas rojo oscuro en las alas anteriores y posteriores, ro...

Vive en zonas herbosas en pendientes, entre rocas y pequeños canchales, de 1500 a 2400 metros. Vuela de julio a agosto, en una generación al año. Se d...

Endémica de Pirineos. Es abundante localmente....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-gorgone.html>

Novedades corológicas

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Primera cita para Asturias - Citado por José González Fernández en Barayo, Navia. ASTURIAS el día 24/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/hemaris-fuciformis/10990.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dysdera erythrina (Arthropoda)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Melanogaster broomeanus Berk. ex Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

Mengoana jeschawi (Ortiz de Zárate, 1949) (Mollusca)

Oxyloma elegans (Risso, 1826) (Mollusca)

Puncturella noachina (Linnaeus, 1771) (Mollusca)

Syrphus ribesii Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

