



Num. 323. Publicado el 06/06/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Armeria duriaei*. Por José Luis Porto Torres



Num. 323. Publicado el 06/06/2011

Descripciones de especies

Uromyces valerianae Fuckel

Hongo de tipo roya que forma las siguientes fases en su ciclo de vida: Picnidios en pequeños grupos, globoso - deprimidos o globosos, amarillo melosos,...

Crece sobre numerosas especies del género Valeriana....

Presente en casi toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uromyces-valerianae.html>

Pharus legumen (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con la concha fina y frágil, alargada, de hasta 13 cm, unas cuatro veces tan larga como honda, con el margen anterior y el posterior r...

Crece enterrado en la arena en el litoral. Burrowing in sand, from the lower shore into the shallow sublittoral....

Aparece desde la costa SO de Inglaterra, Gales e Irlanda, hasta el Mediterráneo y el NO de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pharus-legumen.html>

Ombrophila pura (Pers.) Baral

Macroscopía. Fructificaciones agrupadas, de 10 - 25 mm de diámetro, de forma turbinada a urceolada cuando son jóvenes para volverse luego expandidas e...

Crece en troncos y ramas de hayas (*Fagus sylvatica*) y robles (*Quercus*), desde verano a invierno....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ombrophila-pura.html>

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

Mariposa con una envergadura alar de 28 a 38 mm, polimorfa. El macho tiene generalmente el anverso de color rojo oscuro con amplias irisaciones violác...

Vive en prados húmedos y turberas en zonas montañosas, desde 600 hasta 1700 metros. Vuela entre junio y julio, en una generación al año. Al parecer es...



Está extendida por parte del sur, centro y norte de Europa hasta los Urales. En la Península Ibérica está restringida a zonas montañosas de los Pirineos...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-hippotoe.html>

Centaurea janeri subsp. gallaecica Laínz

Planta perenne, de aspecto agrisado, con numerosos tallos acostados de hasta 40 cm, decumbentes. Hojas basales y caulinas lanceoladas - espatuladas, e...

Vive exclusivamente en prados y brezales derivados sobre suelos de rocas serpentínicas, ligada frecuentemente a *Sagina merinoi*, de donde constituye un...

Alrededores de Melide, Galicia...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-janeri-subsp-gallaecica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Evarcha falcata (Arthropoda)

Galba truncatula (Müller, 1774) (Mollusca)

Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin (Magnoliophyta)

Orobanche picridis F.W. Schultz (Magnoliophyta)

Passalora depressa (Berk. & Broome) Sacc. (Ascomycota)

Trachyspora intrusa (Grev.) Arthur (Basidiomycota)

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

