



## Num. 324. Publicado el 13/06/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Remleria myrtilloides*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 324. Publicado el 13/06/2011**

## Descripciones de especies

### *Preissia quadrata* (Scop.) Nees

Hepática talosa de tamaño medio que se ramifica dicotómicamente en ramas de hasta 1 cm de anchura, a menudo creciendo en grupo; el talo no es aromático...

Aparece en terrenos calizos, pero también sobre el suelo desarrollado sobre rocas silíceas, en cascadas y bordes de cursos de agua desde zonas bajas h...

Desde el norte de Europa hasta el sur, poco frecuente en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/preissia-quadrata.html>

### *Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758)

Pequeña mariposa muy variable de aspecto: la forma estival tiene las alas anteriores de color dorado con una sufusión gris, mientras que las posterior...

Vive en praderas y colinas secas, bordes y claros de bosque. Vuela de abril a septiembre, en dos generaciones. Se trata de una especie de vuelo diurno...

Aparece desde Europa Occidental hasta Eurasia. En la Península Ibérica se presenta en casi todas las provincias....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lythria-purpuraria.html>

### *Lycoperdon echinatum* Pers.

Macroscopía. Fructificaciones generalmente dispuestas en pequeños grupos, de forma casi globosos a turbinados, sacciformes o piriformes, de hasta 6 x ...

Crece en bosques de planifolios, preferentemente hayedos (*Fagus sylvatica*) y robles (*Quercus robur*), siendo más raro bajo coníferas....

Presente en toda Europa. No es frecuente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-echinatum.html>

### *Dermea ariae* (Pers.) Tul. & C. Tul. ex P. Karst.

Macroscopía. Apotecios errumpentes, gregarios, separados o en grupos de 2 - 4, de circulares a ondulados, sésiles, estrechados en la base, de 0.4 -



0....

Es un hongo específico de la madera de Sorbus aucuparia...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dermea-ariae.html>

*Aequipecten opercularis* (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo de hasta 90 mm, generalmente menor, de concha fina y frágil; las valvas son diferentes, ya que la valva izquierda es más convexa que l...

Vive en agregaciones densas en sustratos arenosos o de grava hasta los 100 m de profundidad, ocasionalmente en el intermareal. ...

Desde el Mar del Norte y Noruega hasta el Mediterráneo y las Islas Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aequipecten-opercularis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Hymenoscyphus kathiae* (Korf) Baral (Ascomycota)

*Ornithogalum broteroi* Laínz (Magnoliophyta)

*Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp (Magnoliophyta)

*Ranunculus bupleuroides* Brot. (Magnoliophyta)

*Rissoa lilacina* Récluz, 1843 (Mollusca)

*Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840) (Arthropoda)

*Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

