



## Num. 326. Publicado el 27/06/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Puccinia poarum*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 326. Publicado el 27/06/2011**

## Descripciones de especies

*Onchidella celtica* (Cuvier, 1816)

Animal de cuerpo sólido, ovalado, carnoso, de hasta 13 mm de longitud y 6 de anchura. Es de color verde negruzco oscuro, y tiene un manto que esta cub...

Vive generalmente en costas arenosas entre mejillones, balanos y grietas de rocas. Se alimenta de algas....

Aparece desde las costas inglesas a las Azores e Italia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onchidella-celtica.html>

*Mollisia revincta* (P. Karst.) Rehm

Macroscopía: ascomas de hasta 1 mm de diámetro, sésiles, gregarios, inicialmente urceolados y errumpentes, más tarde superficiales, con el himenio apl...

Crece en la madera de árboles caducifolios, especialmente en robles (*Quercus*) y castaños (*Castanea sativa*)....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mollisia-revincta.html>

*Leptinotarsa decemlineata* Say, 1824

El conocido escarabajo de la patata, de unos de 10 x 6 mm, tiene un cuerpo robusto, ovalado, fuertemente convexo y endurecido. Se distingue fácilmente...

El ciclo anual del escarabajo de la patata comienza en primavera o principios de verano, cuando, dependiendo del clima y del estado fisiológico, emerge...

Este esarabaja fue descrito en 1824 por Thomas Say a partir de especímenes recogidos en plantas de *Solanum rostratum* en las Montañas Rocosas. Su orig...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leptinotarsa-decemlineata.html>

*Juncus trifidus* L.

Hierba perenne, de 5 - 24 cm, densamente cespitosa, con brotes extravaginales e intravaginales; rizoma con entrenudos muy cortos, cubiertos por vainas...



Vive en pastos cacuminales psicroxerófilos y fisuras de rocas, en substrato silíceo poco profundo, desde los (1200) 1700 - 2550 (3000) m....

Aparece en el norte y zonas montañosas del centro y sur de Europa, norte y centro de Asia, y Groenlandia, y este de Norteamérica. Cordilleras del N de...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-trifidus.html>

## *Exidia saccharina* Fr.

Macroscopía: hongo que forma cuerpos fructíferos pustulosos, más o menos estipitados, con la parte inferior algo granulosa, que con frecuencia confluy...

Crece sobre madera de coníferas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/exidia-saccharina.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Dinoptera collaris* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Nemoptera bipennis* (Illiger, 1812) (Arthropoda)

*Neuroterus numismalis* Geoffroy in Fourcroy, 1785 (Arthropoda)

*Pachyella celtica* (Boud.) Häffner (Ascomycota)

*Polistes dominula* (Christ, 1791) (Arthropoda)

*Pyropteron chrysidiformis* Esper, 1782 (Arthropoda)

*Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

