



Num. 327. Publicado el 04/07/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 327. Publicado el 04/07/2011

Descripciones de especies

Pucciniastrum guttatum (J. Schröt.) Hyl., Jørst. & Nannf.

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos o reunidos en grupos irregulares, redondeados, hemisféricos, de hasta 0.2 mm de diámetro...

Crece en hojas de especies del género *Asperula*, como *Asperula odorata*, del género *Galium*, como *Galium mollugo*, *Galium verum*, ... y también en *Sherardi*...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-guttatum.html>

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

El macho tiene el anverso de color azul oscuro, con las fimbrias claramente ajedrezadas, y en ocasiones con puntos negros pequeños en el margen del al...

Vive en prados y laderas floridas, desde el nivel del mar a 1.800 metros. Vuela de mayo a octubre, en dos generaciones al año. Puede hibridar con *Poly...*

Está extendida por toda Europa hasta el Cáucaso. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. En Asturias está distribuida espe...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-bellargus-.html>

Margotia gummifera (Desf.) Lange

Planta herbácea perenne, con una raíz axonomorfa de hasta 8 cm de diámetro de la que surgen tallos que miden hasta 180 cm, erectos, cilíndricos y estr...

Crece en matorrales degradados sobre suelos ácidos, como cuarcitas, granitos y areniscas, siendo más rara de observar en suelos básicos; aparece desde...

Aparece en la Península Ibérica y el NO de África....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/margotia-gummifera.html>

Cernuella virgata (da Costa, 1778)



Molusco con una concha de 8-15 x 12-23 mm, blanquecina o amarillanta, en ocasiones algo rojiza, normalmente con dos bandas pardas en la parte superior...

Vive en ambientes relativamente secos como dunas y bajo plantas en sustratos calizos, siendo frecuente en regiones costeras, pero también en zonas hum...

Aparece desde las Islas Británicas hasta la Península Ibérica y regiones costeras mediterráneas hasta Crimea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cernuella-virgata.html>

Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan

Macroscopía. Fructificaciones gregarias o apiñadas, superficiales y sésiles, de 0.5 - 1.5 µm de diámetro y hasta 0.6 µm de alto. El recept...

Crece en excrementos de zorro, conejos, ratones pero también en egagrópilas y tallos podridos de Brassica. Aunque puede crecer en muchos sustratos, es...

Europa y Norteamérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ascobolus-brassicae.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ammothella longipes (Hodge, 1864) (Arthropoda)

Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Malva tournefortiana L. (Magnoliophyta)

Rhopalus subrufus (Arthropoda)

Sedum lagascae Pau (Magnoliophyta)

