



## Num. 330. Publicado el 25/07/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Anas clypeata*. Por César Fernández González



**Num. 330. Publicado el 25/07/2011**

## Descripciones de especies

### *Ranunculus bupleuroides* Brot.

Planta perenne, de (15) 25 - 50 (65) cm, con la base del tallo, peciolos y márgenes de las hojas más o menos flocosos, rara vez glabrescentes. Raíces ...

Pastos secos, pinares aclarados, ... principalmente en suelos silíceos más o menos secos...

Endemismo de la Península Ibérica que aparece en el sur de Galicia y el centro y norte de Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-bupleuroides.html>

### *Onchidoris depressa* (Alder & Hancock, 1842)

Nudibranquio de cuerpo aplanado, blanquecino, semitransparente y de contorno ovalado, que generalmente no supera los 9 mm de longitud. En el dorso exi...

Vive en aguas poco profundas, generalmente entre 5 y 45 m de profundidad, donde se alimenta del briozoo *Schizomavella linearis*. Se trata de una especi...

Se distribuye por la costa atlántica europea hasta las Islas Británicas, también se encuentra en el Mar Mediterráneo. Ha sido recolectado en el Océano...

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onchidoris-depressa.html>

### *Lachnum fasciculare* Velen.

Macroscopía: ascomas superficiales y gregarios, cupuliformes, brevemente estipitados, de hasta 2 mm de diámetro. Himenio inicialmente blanco o blanque...

Crece sobre madera de caducifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-fasciculare.html>

### *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 48 - 60 mm. El macho tiene el anverso de color leonado, con dobles hileras de puntos oscuros. El reverso del ala ...



Vive en prados floridos, brezales, bordes de caminos y zonas abiertas cercanas a bosques, desde zonas bajas a cerca de 2000 metros. Vuela de junio a a...

Está extendida por Marruecos y Europa hasta Japón. En la Península Ibérica presenta una distribución semejante a *A. paphia*. En Asturias está extendida...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/argynnis-aglaja.html>

*Agaricus gennadii* (Chatin & Boud.) P. D. Orton

Macroscopía. Basidiomas de solitarios a reunidos en pequeños grupos. Sombrero de 65 - 100 mm, al principio hemisférico, luego extendido y al final con...

Crece de primavera a otoño en terrenos arenosos y jardines....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-gennadii.html>

## **Novedades corológicas**

*Entoloma griseoluridum* (Kühner) M. M. Moser (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 24/07/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//11267.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Entoloma griseoluridum* (Kühner) M. M. Moser (Basidiomycota)

*Iberodorcadion seoanei* (Graells, 1858) (Arthropoda)

*Lactuca perennis* L. (Magnoliophyta)

*Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill. (Magnoliophyta)

*Puccinia pimpinellae* (F. Strauss) Link (Basidiomycota)

*Torilis leptophylla* (L.) Rchb. fil. (Magnoliophyta)

