



## **Num. 331. Publicado el 01/08/2011**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por César Fernández González



**Num. 331. Publicado el 01/08/2011**

## Descripciones de especies

*Trichophaea abundans* (P. Karst.) Boud.

Macroscopía. Hongo que forma ascomas gregarios, sésiles y discoideos de hasta 1 mm de diámetro, con un himenio y excípulo de color muy oscuro, negro v...

Se trata de un hongo carbonícola....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trichophaea-abundans.html>

*Puccinia eriophori* Thüm.

Hongo de tipo roya, heteroica, que no forma uredosoros en su ciclo vital. Los eciosoros son hipófilos, aparecen reunidos en grupos redondeados sobre m...

Forma los teliosoros en hojas viejas y algo secas de numerosas especies de Eriophorum. Los picnios y ecidiosoros se desarrollan sobre Solidago...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-eriophori.html>

*Helix aspersa* Müller, 1774

El caracol común se caracteriza por su periostraco pardo dorado característicamente interrumpido por bandas de color pardo. Su concha, de 30 - 35 x 32...

Vive entre arbustos, en bosques muy abiertos, en campos y también en zonas dunares. Se alimenta de hierbas y puede ser un problema por esto en huertas...

Aparece en la región mediterránea, las costas atlánticas hasta las Islas Británicas y se introdujo hace siglos en Grecia, las Islas Británicas y Europ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helix-aspersa.html>

*Euphorbia dulcis* L.

Planta perenne, rizomatosa. Rizoma horizontal, largo, carnoso, articulado, formado por gruesos segmentos contiguos, amarillo. Tallos de (18)27-42(52)...

Crece en prados relativamente húmedos, dentro y fuera de bosques caducifolios, con una clara preferencia por lugares nemorales y éutrofos; raramente ...



Aparece desde el centro, oeste y norte de Europa hasta el norte de Rusia. En la Península, principalmente en las montañas del N y NO de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-dulcis.html>

*Ammothella longipes* (Hodge, 1864)

Cuerpo grueso y sólido, un tanto aplanado. Segundo segmento del tronco separado del céfalon en el mismo grado que del siguiente. Los dos últimos segme...

Vive en los pisos intermareales y sublitorales de costas rocosas, sobre hidrarios, briozoos y algas....

Se distribuye a lo largo de la costa atlántica europea, desde el oeste del Mar Mediterráneo hasta las Islas Británicas. Esta especie ha sido citada en...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel & DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ammotherella-longipes.html>

## **Novedades corológicas**

*Thelephora cuticularis* Berk. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 26/07/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/thelephora-cuticularis-berk-1/11281.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bolbitius reticulatus* (Pers.) Ricken (Basidiomycota)

*Phragmidium rosae-pimpinellifoliae* Dietel (Basidiomycota)

*Podospora setosa* (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

*Puccinia punctiformis* (F. Strauss) Röhl. (Basidiomycota)

*Saccobolus globuliferellus* Seaver (Ascomycota)

*Thelephora cuticularis* Berk. (Basidiomycota)

