



Num. 332. Publicado el 08/08/2011

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hebeloma gigaspermum*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 332. Publicado el 08/08/2011

Descripciones de especies

Veronica anagallis-aquatica L.

Planta herbácea perenne, raramente anual o bienal, que en general es pubescente - glandulosa en la inflorescencia. Sus tallos, de 10 a 100 cm, son er...

Crece en bordes de cursos de agua, charcas, en fuentes, y en general, en zonas encharcadas, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud...

Es una planta subcosmopolita, que aparece en Europa (salvo en las zonas más septentrionales), la mayor parte de Asia, el norte y este de África, Sudáf...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-anagallis-aquatica.html>

Tremella karstenii Hauerslev

Macroscopía: fructificaciones gelatinosas, pustulosas, de 1 - 2 mm de diámetro, hialinos cuando están frescos, pruinosos, con la superficie lisa o alg...

Parasita las fructificaciones de un ascomycete llamado *Colpoma juniperi* que, a su vez, se desarrolla sobre las ramas de algunos enebros (*Juniperus* com...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tremella-karstenii.html>

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Mariposa polimorfa, con una envergadura alar entre 26 y 30 mm. El macho tiene el anverso de color pardo-gris, salpicado de manchas oscuras; en los már...

Vive en prados y terrenos abiertos húmedos, desde el nivel del mar a 2000 metros. Vuela desde abril a octubre, en tres generaciones al año. Los machos...

Está extendida por el tercio norte de la Península Ibérica y gran parte de Europa, llegando hasta Siberia. En la Península Ibérica está presente solam...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-tityrus.html>

Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell



Hongo que desarrolla un micelio en tallos, inflorescencias y hojas, tanto en el haz como en el envés, efuso o parcheado. Sobre las hifas se forman con...

Parasita diferentes plantas de la familia Cruciferae, pero también Resedaceae y Papaveraceae....

Circumglobal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-cruciferarum.html>

Discus rotundatus (Muller, 1774)

Caracol terrestre de 2 - 4 x 5.5 - 7 mm, con una concha deprimida, con un ombligo que ocupa más de un tercio del diámetro de la misma, con la espira d...

Vive en zonas moderadamente húmedas y umbrosas de bosques más o menos abiertos, tolerando sustratos no calcáreos; en el sur es frecuente bajo piedras ...

Desde el sur de Escandinavia y el Báltico a las islas del Atlántico central, oeste de Europa e Italia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/discus-rotundatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acer monspessulanum L. (Magnoliophyta)

Aplocera praeformata Hübner, 1826 (Arthropoda)

Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss. in DC. (Magnoliophyta)

Armeria rothmaleri Nieto Fel. (Magnoliophyta)

Campanula adsurgens Levier & Leresche (Magnoliophyta)

Chaetomium bostrychodes Zopf (Ascomycota)

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Neocallicrania selligera (Charpentier, 1825) (Arthropoda)



Russula raoultii Quéf. (Basidiomycota)

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

