



## Num. 341. Publicado el 10/10/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Doronicum grandiflorum subsp. viscosum*. Por César Fernández González



**Num. 341. Publicado el 10/10/2011**

## Descripciones de especies

### *Puccinia pimpinellae* (F. Strauss) Link

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vitan presenta las siguientes fases: Picnidios anfígenos, esparcidos o agrupados en las dos caras de las hojas, generalme...

Parasita plantas del género Pimpinella, como Pimpinella saxifraga y también géneros próximos....

En la Península Ibérica se ha citado en el centro, oeste, norte o este....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-pimpinellae.html>

### *Phragmidium rosae-pimpinellifoliae* Dietel

Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital formado por las siguientes fases: Espermogonios principalmente en los brotes, dispuestos irregularmente, a ...

Parasita numerosas especies de Rosa, como Rosa canina, Rosa pimpinellifolia,.....

Hemisferio norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-rosae-pimpinellifoliae.html>

### *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)

El macho tiene el anverso del ala anterior de color anaranjado-amarillento, con una amplia banda oscura en el margen, siendo el ala posterior de color...

Aparece en márgenes de caminos, prados húmedos, zonas arbustivas y laderas herbosas, desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Vuela de junio a agosto...

Está extendida por gran parte de Europa hasta los Urales. Está presente solamente en las zonas central y septentrional de la Península Ibérica. En Ast...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-arcania.html>

### *Carex nigra* (L.) Reichard

Planta perenne en ocasiones algo cespitosa, con un rizoma de entrenudos largos del que surgen tallos trígonos de 5 a 50 cm, escábridos en la parte



su...

Crece en prados húmedos, turberas, zonas temporalmente inundadas y en bordes de arroyos, desde los 1000 a los 3300 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa, el O de Asia, el N de África, Groenlandia y el NE de América del Norte. En la Península Ibérica es posible observ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-nigra.html>

*Calycellina araneocincta* (W. Phillips) Baral & P. Blank

Macroscopía. Ascomas gregarios, de 0,1-0,3 mm de diámetro, superficiales, sésiles, pulvinados a subcupuliformes, con el himenio de color amarillo citr...

Crece sobre hojas muertas de caducifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calycellina-araneocincta.html>

## Novidades corológicas

*Alnicola macrospora* J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 06/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/alnicola-macrospora-j-e-lange-ex-j-favre-1/11646.html>

*Melanopsamma pomiformis* (Pers.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanopsamma-pomiformis-pers-sacc-1/11667.html>

*Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Baselgas, Grado. ASTURIAS el día 03/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pleurotus-cornucopiae-paulet-rolland-1/11629.html>

*Typhula spathulata* (Peck) Berthier (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pedroveya, Quirós. ASTURIAS el día 09/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/typhula-spathulata-peck-berthier-1/11665.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Alnicola macrospora* J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)

*Araneus angulatus* Clerck, 1757 (Arthropoda)

*Camarophyllopsis foetens* (W. Phillips) Arnolds (Basidiomycota)

*Cortinarius atrovirens* Kalchbr. (Basidiomycota)

*Cucullia tanaceti* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Erysiphe aquilegiae* var. *aquilegiae* DC. (Ascomycota)

*Lepiota xanthophylla* P. D. Orton (Basidiomycota)

*Leucoagaricus sericifer* (Locq.) Vellinga (Basidiomycota)

*Limacella delicata* var. *delicata* (Fr.) Earle (Basidiomycota)

*Melanopsamma pomiformis* (Pers.) Sacc. (Ascomycota)

*Mycena nucicola* Huijsman (Basidiomycota)

*Perenniporia fraxinea* (Bull.) Ryvarden (Basidiomycota)

*Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland (Basidiomycota)

*Psilothrix viridicoerulea* (Geoffroy 1785) (Arthropoda)

*Sawadaea bicornis* (Wallr.) Homma (Ascomycota)

*Scotopteryx chenopodiata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Typhula spathulata* (Peck) Berthier (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008