



Num. 345. Publicado el 07/11/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pseudopeziza trifolii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 345. Publicado el 07/11/2011

Descripciones de especies

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Libélula de 38 a 43 mm de longitud, de color generalmente de amarillenta a pardo verdosa en las hembras y machos jóvenes. La cabeza es globosa y tiene ...

Los adultos pueden observarse durante todo el año en el sur de Europa, pero tan sólo de junio a noviembre en zonas más nórdicas. Puede contemplarse en...

Aparece en Europa, el norte de África y en Asia. Es una de las libélulas más comunes de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sympetrum-striolatum.html>

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma

Hongo que desarrolla un micelio blanquecino, efuso o en parches, sobre las hojas, tanto en el haz como en el envés, persistente o evanescente, con hif...

Parasita *Acer pseudoplatanus* y *Acer campestre*, apareciendo también en *Acer catalpifolium*, *Acer caudatum* var. *multiserratum*, *Acer mono*, *Acer monspessul...*

Ampliamente distribuido por Norteamérica, Europa, África y Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sawadaea-bicornis.html>

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp

Hierba perenne de rizoma corto, de 1-2 cm de diámetro, del que pueden surgir pequeños rizomas secundarios; raíces de 1 - 5 mm de diámetro; base de la...

Vive en pastos, bordes de regueros y bosques umbríos, en suelos profundos, húmedos y eutróficos, desde los 50 a los 1300 m de altitud....

Planta endémica del NO de la Península Ibérica, desde las montañas del sur de Galicia hasta un poco más al sur del Sistema Central...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paradisea-lusitanica.html>

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Macroscopía: hongo que forma fructificaciones resupinadas, de jóvenes de discoideas a ciatiformes para hacerse luego resupinados, expandidos y



ondula...

Crece durante el otoño sobre restos leñosos de planifolios, raramente sobre coníferas....

Frecuente en toda Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/exidia-glandulosa.html>

Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach

Macroscopía: hongo que forma basidiomas con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, al principio globoso, luego convexo y finalmente convexo - aplanado,...

Crece en jardines, huertos, zonas estercoladas, formando generalmente los llamados corros de brujas....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bisporus.html>

Novedades corológicas

Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Los Calbuetos, Soto del Barco. ASTURIAS el día 04/11/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//11790.html>

Nemania diffusa (Sowerby) Gray (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Lazana, Regueras (Las). ASTURIAS el día 02/11/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/nemania-diffusa-sowerby-gray-1/11786.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát (Basidiomycota)

Drapetisca socialis (Arthropoda)

Hypoxylon perforatum (Schwein.) Fr. (Ascomycota)

Nemania diffusa (Sowerby) Gray (Ascomycota)



Strossmayeria basitricha (Sacc.) Dennis (Ascomycota)

