



Num. 347. Publicado el 21/11/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Anas clypeata*. Por César Fernández González



Num. 347. Publicado el 21/11/2011

Descripciones de especies

Sedum lagascae Pau

Planta anual, glandular-pubescente, verdosa o rojiza. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo (6) 8 - 16 (25) cm, erecto, ramificado. Hojas 5 - ...

Pastos de montaña, en zonas rezumantes, bordes de arroyos, torrenteras, etc. desde los 1000 a los 2000 m....

Se trata de una planta endémica de las sierras de Béjar y Gredos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-lagascae.html>

Polytrichum juniperinum Hedw.

Musgo que ocupa extensivas áreas, formadas por gametofitos acrocárpicos generalmente no ramificados y erguidos. Caulidio de 1.5 a 4 cm de altura, gene...

Especie típica de áreas secas y expuestas sobre sustratos ácidos y colonizadora de espacios recién perturbados. Sus hábitats más favorables son zonas ...

Musgo cosmopolita que puede encontrarse en todos los continentes, incluso en la Antártida....

Por CANO RUIZ, Judith y MARTÍNEZ SAGARRA, Gloria

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polytrichum-juniperinum.html>

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff

Hongo que desarrolla un micelio sobre los tallos y hojas, efuso o en parches blanquecinos, evanescentes o persistentes, que al principio es hialino pa...

Crece sobre numerosas géneros de plantas de la subclase Asteridae....

Casi circunglobal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podosphaera-fusca.html>

Lactarius trivialis (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 40 - 250 (200) mm de diámetro, al principio convexo con el margen enrollado, luego expandido, con el centro más o menos...



Lactarius trivialis es una seta que crece desde julio a octubre entre abedules y también *Picea*, especialmente en bosques desarrollados sobre sustratos...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-trivialis.html>

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Es una especie muy variable, de entre 46 y 54 mm, lo que se atribuye a adaptaciones ecológicas: así, las formas claras serían propias de lugares caliz...

Pinares, terrenos secos y pedregosos, barrancos, zonas herbosas, brezales y bordes de caminos, desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Vuela de juni...

Aparece por la mayor parte de Europa hasta Escandinavia. Está presente en la gran parte de la Península Ibérica, especialmente en el centro y el norte...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-semele.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arctosa cinerea Fabricius, 1777 (Arthropoda)

Entoloma chalybaeum (Fr.) Noordel. (Basidiomycota)

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Fumagospora capnodioides G. Arnaud (Ascomycota)

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

Nigma walckenaeri (Arthropoda)

Omphalina obscurata D. A. Reid (Basidiomycota)

Tricholoma josserandii Bon (Basidiomycota)

