



## **Num. 348. Publicado el 28/11/2011**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por José Luis Porto Torres



**Num. 348. Publicado el 28/11/2011**

## Descripciones de especies

*Tomares ballus* (Fabricius, 1787)

El macho tiene el anverso de color de fondo pardo oscuro; el reverso del ala anterior es de color anaranjado claro, con máculas negras; el del ala pos...

Vive en claros en encinares y alcornoques y zonas abiertas y secas, de 200 a 1000 metros. Vuela de marzo a abril, en una generación al año. Los imag...

Está extendida por el norte de África, las zona centro y sur de la Península Ibérica y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está distribu...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tomares-ballus.html>

*Koeleria glauca* (Schrad.) DC.

Planta herbácea densamente cespitosa, con tallos de 10 a 45 cm, robustos, engrosados en la base, glabros en ella pero puberulentos en la parte superio...

Crece en arenales costeros, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....

Aparece en Europa, desde el norte de la Península Ibérica, Hungría y el norte de Crimea hasta Escocia y el norte de Rusia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/koeleria-glauca.html>

*Geum sylvaticum* Pourr.

Planta perenne, con tallos fértiles de hasta 40 cm, generalmente no ramificados, pero pueden tener en ocasiones 1 o 2 ramas con una flor. Las hojas ba...

Crece en pastos o matorrales, en zonas pedregosas en ocasiones, generalmente de clima submediterráneo - montano y no muy seco, desde los 300 a los 180...

Aparece desde las montañas del Magreb hasta el SE de Francia; en la Península abunda en todo el territorio excepto en la Cornisa Cantábrica y el Algar...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geum-sylvaticum.html>

*Erysiphe aquilegiae* var. *aquilegiae* DC.



Hongo que forma un micelio anfigeno pero que también puede crecer en tallos y en ocasiones en peciolos, efuso o parcheado, de evanescente a subpersist...

Parasita la aguileña, *Aquilegia vulgaris* subsp. *vulgaris*, pero también otras ranunculáceas, pertenecientes a los géneros *Clematis*, *Actaea*, *Ranunculus*,...

Europa, Asia, Norteamérica. Introducida en Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica....

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-aquilegiae-var-aquilegiae.html>

*Agaricus bitorquis* (Quéf.) Sacc.

Macroscopía. Hongo con un sombrero de 6 - 18 cm de diámetro, muy espeso y carnoso, de plano convexo a plano, a veces con una leve depresión central, c...

Es una especie ruderal que micorriza con especies arbóreas y crece en lugares incultos, bosques, zonas herbosas, parques de ciudades, en ocasiones jun...

Por [asturnatura.com](http://asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-bitorquis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acanthinula aculeata* (Müller, 1774) (Mollusca)

*Azeca goodalli* (Férussac, 1821) (Mollusca)

*Bolbitius elegans* E. Horak, G. Moreno, A. Ortega & Esteve-Rav. (Basidiomycota)

*Contumyces rosellus* (M.M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni (Basidiomycota)

*Contumyces vesuvianus* (F. Brig.) Redhead (Basidiomycota)

*Coprinus jonesii* Peck (Basidiomycota)

*Cortinarius bulliardii* (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

*Cortinarius quercus-ilicis* (Chevassut & Rob. Henry) Rob. Henry (Basidiomycota)

*Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)



*Laccaria bicolor* (Maire) P. D. Orton (Basidiomycota)

*Lactarius flavidus* Boud. (Basidiomycota)

*Marasmius corbariensis* (Roum.) Singer (Basidiomycota)

*Marasmius wynneae* Berk. & Broome (Basidiomycota)

*Monacha cartusiana* (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)

*Pyramidula pusilla* (Vallot, 1801) (Mollusca)

*Rhodocybe fallax* (Quél.) Singer (Basidiomycota)

*Russula pectinatoides* Peck (Basidiomycota)

*Scleroderma meridionale* Demoulin & Malençon (Basidiomycota)

*Tapinella panuoides* (Batsch) E.-J. Gilbert (Basidiomycota)

*Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk in Grilli (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

