



Num. 349. Publicado el 05/12/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Stachys germanica*. Por José Luis Porto Torres



Num. 349. Publicado el 05/12/2011

Descripciones de especies

Podosphaera myrtilina var. *myrtilina* Kunze

Hongo que desarrolla un micelio anfégeno, efuso, evanescente, con un estado conidial apenas desarrollado; conidios de 27 - 35 x 14 - 18 µm.
Cuer...

Crece sobre el arándano, *Vaccinium myrtillus*...

Europa, Asia y Norteamérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podosphaera-myrtilina-var-myrtilina.html>

Euchloe simplonia (Boisduval, 1828)

Mariposa con una envergadura alar de 40 - 48 mm. Su aspecto es similar al de *Euchloe crameri*, con la particularidad de que carece de las líneas negras...

Vive en praderas y laderas en montañas, desde 400 metros en desfiladeros, hasta los 1.800 metros. Vuela de abril a julio, según altitud, en una gener...

Está extendida por zonas montañosas de la Península Ibérica, Francia, Suiza e Italia. Su distribución en la Península es más restringida que la de Euc...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euchloe-simplonia.html>

Boletus radicans Pers.

Macroscopía. Boletal con un sombrero de hasta 20 cm de diámetro, al principio globoso, hemisférico, para hacerse luego plano convexo o extendido, con ...

Aparece durante verano y otoño en bosques de frondosas, especialmente de encinas (*Quercus ilex*) y quejigos (*Quercus faginea*), pero también de robles (...)

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-radicans.html>

Asperugo procumbens L.

Hierba anual uni o multicaule, setoso-hispida, con setas de base tuberculada. Tallos de hasta 60 (-100) cm, decumbentes, ascendentes o trepadores,



si...

Es una planta nitrófila, ruderal, arvense, viaria, que crece sobre suelos básicos, particularmente calizas, margas y yesos, siendo más rara sobre suel...

Europa, O de Asia, NO de Africa. N, centro, E y S de la Peninsula Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asperugo-procumbens.html>

Armeria rothmaleri Nieto Fel.

Planta con cepa ramificada y ramas más o menos largas, cubiertas de abundantes restosfoliares pardo-rojizos. Hojas 15-90 x 3-15 mm, homomorfas, lance...

Crece en fisuras y repisas de roquedos calizos más o menos dolomitizados; 500-1600 m....

Endémica del SO de la provincia de León (Montes Aquilianos) y E de la de Orense....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-rothmaleri.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)

Clavaria incarnata Weinm. (Basidiomycota)

Cortinarius arcuatorum Rob. Henry (Basidiomycota)

Cortinarius aurilicis Chevassut & Trescol (Basidiomycota)

Cortinarius moenne-loccozii Bidaud (Basidiomycota)

Cortinarius natalis var. *natalis* D. Antonini & M. Antonini (Basidiomycota)

Cortinarius olivaceofuscus Kühner (Basidiomycota)

Cortinarius variiformis Malençon in Malençon & Bertault (Basidiomycota)

Hemimycena tortuosa (P. D. Orton) Redhead (Basidiomycota)



Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. (Basidiomycota)

Hygrocybe ceracea (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Hygrophorus lindtneri M. M. Moser (Basidiomycota)

Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)

Russula anthracina Romagn. (Basidiomycota)

Tuberolachnus salignus (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008