



Num. 352. Publicado el 26/12/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Melanocoryphus albomaculatus*. Por César Fernández González



Num. 352. Publicado el 26/12/2011

Descripciones de especies

Laetinaevia adonis (Fuckel) Nannf.

Macroscopía: hongo que forma diminutos ascomas errumpentes, pustulosos, subglobulosos, de color anaranjado pálido y de hasta 0,25 mm de diámetro sobr...

Crece en hojas muertas y muy húmedas de *Ranunculus aconitifolius* que han persistido durante el invierno, aunque originalmente descrito en hojas de Ado...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/laetinaevia-adonis.html>

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 40 - 45 mm de envergadura, con el cuerpo de color ocre, provisto de una banda abdominal rojo muy oscuro, con la parte del final del abdome...

Vive en bosques de ribera y claros y linderos en zonas arboladas, mostrando predilección por los terrenos soleados, desde el nivel del mar a 2.000 met...

Aparece por Europa y norte de África, llegando hasta Japón. En la Península Ibérica está presente en parte de la zona norte (Pirineos, sistemas Ibéric...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hemaris-fuciformis.html>

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer

Macroscopía. Basidiomas anuales, sésiles, aplanados, semicirculares, a menudo fusionados lateralmente e imbricados, de 15 - 20 cm de largo y 1.3 -3 cm...

Fructifica sobre madera muerta de árboles, causando en ellos una podredumbre blanca...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/daedaleopsis-tricolor.html>

Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss. in DC.

Planta almohadillada con ramas cortas, cubiertas de abundantes restos foliares. Hojas 0,5-1,5 x 0,4-0,7(0,8) mm, homomorfas, lineares, subpungentes, ...



Vive en pastos psicroxerófilos, gleras, en substratos silíceos, desde los 1500 a los 2500 m....

Endémica del Sistema Central, donde aparece en las sierras de Guadarrama y Gredos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-caespitosa.html>

Arcopagia crassa (Pennant, 1777)

Molusco bivalvo de hasta 6 cm de longitud, con una concha ovalada, algo más larga que profunda, con el umbo posterior a la línea media, cónico y promi...

Vive en depósitos arenosos mixtos en aguas calmadas poco profundas....

No es una especie común; vive desde el Mar del Norte a Senegal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arcopagia-crassa.html>

Novedades corológicas

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Argandenes, Piloña. ASTURIAS el día 25/12/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/amylostereum-chailletii-pers-boidin-1/12123.html>

Psathyrella hirta Peck (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Paladín, Regueras (Las). ASTURIAS el día 22/12/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/psathyrella-hirta-peck-1/12095.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin (Basidiomycota)

Clitocybe leucodiatreta Bon (Basidiomycota)

Panaeolus dunensis Bon & Courtec. (Basidiomycota)

Psathyrella hirta Peck (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (Basidiomycota)

