



Num. 355. Publicado el 16/01/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lactarius musteus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 355. Publicado el 16/01/2012

Descripciones de especies

Parentucellia latifolia (L.) Caruel

Hierba anual con tallos (1.5) 5 - 30 (40) cm, gráciles (hasta de 1.5 mm de grosor en el tercio basal), erectos, simples o a menudo con algunas ramas b...

Crece en pastizales efímeros, calveros pedregosos y rellanos con suelo superficial, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud...

Cuenca mediterránea, región iranoturania y Macaronesia (Canarias), introducida en Australia. En casi toda la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parentucellia-latifolia.html>

Malva tournefortiana L.

Hierba perenne con tallos generalmente de 0.3 - 0.6 m, que alcanzan alguna vez 1.5m, erectos, simples o ramosos, setoso-hispidos, con pelos simples ...

Crece en pastizales y matorrales húmedos o, a veces, algo secos, principalmente en substratos silíceos, lugaressecos y pedregosos, cultivos, viaria,...

Francia yPenínsula Ibérica, excepto en el SW...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/malva-tournefortiana.html>

Lactarius musteus Fr.

Macroscopía. Hongo con un sombrero de 35 - 75 mm de diámetro, convexo con el centro deprimido y el margen enrollado. Superficie lisa, vísc...

Aparece desde agosto a octubre en bosques de pinos desarrollados sobre suelos pobres, típicamente entre líquenes del género Cladonia y en turberas de ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-musteus.html>

Iodophanus carneus (Pers.) Korf in Kimbrough & Korf

Macroscopía. Apotecios sésiles, membranosos - gelatinosos, inicialmente globosos pero luego de pulvinados a subdiscoidales o deformados si viven densa...

Crece durante todo el año en excrementos, restos vegetales,.....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iodophanus-carneus.html>

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)

Es una especie muy variable. El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, con unas bandas amarillentas visibles, sobre todo, en el ala posterior;...

Vive en claros de bosque, pistas forestales y zonas abiertas y secas, desde el nivel del mar hasta 2000 metros. Vuela de junio a septiembre, en una ge...

Está extendida por Marruecos y el sur y centro de Europa hasta Ucrania. Está presente en gran parte de los sistemas montañosos de la Península Ibérica...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-alcyone.html>

Novedades corológicas

Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Caranga de Abajo, Proaza. ASTURIAS el día 15/01/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12202.html>

Diatrype spilomea Syd. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Encinedo, Regueras (Las). ASTURIAS el día 10/01/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diatrype-spilomea-syd-1/12187.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels (Ascomycota)

Diatrype spilomea Syd. (Ascomycota)

Halimium halimifolium (L.) Willk. in Willk. & Lange (Magnoliophyta)

Passiflora racemosa Brot. (Magnoliophyta)

Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden (Basidiomycota)



Steropus gallega (Fairmaire, 1859) (Arthropoda)

Trechispora alnicola (Bourdot & Galzin) Liberta (Basidiomycota)

