



Num. 356. Publicado el 23/01/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lophiostoma viridarium*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 356. Publicado el 23/01/2012

Descripciones de especies

Puccinia pulverulenta Grev.

Hongo de tipo roya cuyo micelio parece ser perenne y que comienza una nueva infección cuando la planta inicia su desarrollo estacional. Los picnios est...

Crece sobre diferentes especies de *Epilobium*, como *Epilobium hirsutum*, *Epilobium montanum*, *Epilobium parviflorum* y *Epilobium tetragonum*....

Aparece en Europa, Siberia, América boreal y Australia, siendo en la Península frecuente sobre las especies indicadas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-pulverulenta.html>

Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

La hormiguera de turbera es un licénido de gran tamaño, con una envergadura alar de 32 - 38 mm. El macho tiene el anverso de color azul claro con un m...

Vive en turberas, desde el nivel del mar a 1100 metros. Vuela desde julio a finales de agosto, en una generación al año. Los imagos visitan flores com...

Está extendida por la Península Ibérica, y centro y este de Europa hasta Mongolia. En la Península está presente, de una forma muy dispersa, en la zon...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phengaris-alcon.html>

Otidea mirabilis Bolognini & Jamoni

Macroscopía. Ascomas gregarios, cupuliformes, profunda y lateralmente hendidos, de hasta 40 mm de diámetro y 30 mm de altura. Subestipitados por la ex...

Crece en suelos calcáreos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/otidea-mirabilis.html>

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

El milano negro es un ave rapaz de mediano tamaño, de 130 a 155 cm de envergadura, fácil de diferenciar por su coloración en general oscura, alas larga...



Vive en una gran variedad de lugares, si bien prefiere aquellos lugares cercanos a embalses, lagos o ríos. Cuando está en la época reproductora aparec...

Aparece en la mayor parte de las áreas templadas del Paleártico, Australasia y África. En Europa aparece desde el Mediterráneo hasta las zonas menos f...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/milvus-migrans.html>

Halimium halimifolium (L.) Willk. in Willk. & Lange

Arbusto de 1.5-2 m de altura, erecto y ramoso, con ramillas cubiertas de un denso tomento de pelos estrellados y amarillentos. Hojas de 10-40mm, con pe...

Presente en dunas, arenales, pinares litorales, de *Pinus pinaster* y *Pinus pinea*, encinares, alcornacales y zonas de matorral seco en el piso termomedi...

Planta endémica de la zona occidental del Mediterráneo, extendiéndose por Portugal, España, Marruecos, Túnez y el sur de Italia. En la Península se en...

Por CANO RUIZ, Judith & CANO RUIZ, Noemí

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimium-halimifolium.html>

Novedades corológicas

Lophiostoma viridarium Cooke (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Meruxeras, Castrillón. ASTURIAS el día 18/01/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-iridarium-cooke-1/12216.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chaetosphaeria callimorpha (Mont.) Sacc. (Ascomycota)

Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (Basidiomycota)

Lophiostoma viridarium Cooke (Ascomycota)

Salpichroa organifolia (Lam.) Baill. (Magnoliophyta)

