



Num. 358. Publicado el 06/02/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gibellula pulchra*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 358. Publicado el 06/02/2012

Descripciones de especies

Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Molusco con una concha oval, convexa, rugosa, de hasta 60 mm. Lúnula profundamente impresa, oval, con estriaciones finas marrón claro o castaño. Escud...

Es común desde los fondos que quedan al descubierto en la bajar hasta los 100 m de profundidad en fondos arenosos y de gravas. Vive a poca profundidad...

Se distribuye desde el sur del Mar del Norte hasta el Sur y Oeste de África y el Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, César

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venus-verrucosa.html>

Tephrocye ambusta (Fr.) Donk

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 1.5-2.5 cm de diámetro, al principio convexo, luego aplanado, papilado, glabro, lubricoso; tiene color pard...

Hongo que vive estrictamente pirófilo, que vive en hogueras y zonas quemadas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tephrocye-ambusta.html>

Polygonum aviculare L.

Planta anual, herbácea, con tallos de 2-70(100) cm, nudosos, más o menos ramificados, erectos, postrados o postrado-ascendentes, heterófilos sobre to...

Ruderal, arvense, nitrófila y viaria; coloniza fácilmente los lugares despejados o con estiércol, húmedos temporalmente, desde el nivel del mar a los...

Cosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y las Balears, común....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-aviculare.html>

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Abundante mariposa, con una envergadura entre 36 y 44 mm. El macho se diferencia por tener el anverso de color de fondo blanco y venas con líneas gris...



Vuela de febrero a octubre, en varias generaciones al año. Los imagos frecuentan los bebederos, a veces en gran número. Su vuelo es más lento que el d...

Está extendida por el noroeste de África, Europa, Oriente Medio, Próximo Oriente, Asia y América del Norte. Está presente en toda la Península Ibérica...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pieris-napi.html>

Gibellula pulchra Cavara

Hongo que desarrolla hasta 20 sinnemas que surgen de una capa blanquecina o amarillenta de micelio que cubre el huésped, de 3 a 9 mm de longitud, cilí...

Sobre arañas. Los sinnemas sólo se desarrollan una vez que la araña ha muerto y se encuentran frecuentemente en el envés de hojas....

Cosmopolita, pero especialmente aparece en los trópicos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gibellula-pulchra.html>

Novedades corológicas

Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Ablanasos, Candamo. ASTURIAS el día 04/02/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/echinosphaeria-canescens-pers-a-n-mill-huhndorf-1/12279.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)

