



## Num. 36. Publicado el 15/08/2005

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lythria purpurata*. Por César Fernández González



**Num. 36. Publicado el 15/08/2005**

## Descripciones de especies

### *Serranus cabrilla* (Linnaeus, 1758)

Pez de hasta unos 25 cm de longitud, de cuerpo delgado. La cabeza tiene una boca grande, con la mandíbula inferior prominente. Hay 3 espinas en el opé...

Entre rocas, hasta unos 30 m de profundidad por lo general. Se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos y otros peces, como blénidos....

Desde Noruega a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/serranus-cabrilla.html>

### *Herponema velutinum* (Greville) Agardh

Alga parda, de filamentos pequeños, de algo más de 1 mm de longitud, de color pardo oscuro....

Crece sobre las cintas de *Himantalia elongata*, formando sobre ella una mancha aterciopelada parda....

Desde Noruega hasta el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/herponema-velutinum.html>

### *Elachista scutulata* (Smith) Duby

Alga parda, filamentosa, de hasta unos 7 mm de longitud, que surgen de una especie de base almohadillada circular...

Crece sobre cintas de *Himantalia elongata*....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elachista-scutulata.html>

### *Cladophora rupestris* (L.) Kützing

Alga verde, de filamentos uniseriados cuyas células se pueden ver a la lupa debido a su gran tamaño. Los filamentos, con ramificación irregular y a ve...

En rocas en el mediolitoral e infralitoral, tanto en zonas calmadas como expuesta, adquiriendo diferentes morfologías en cada caso....

Cosmopolita....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladophora-rupestris.html>

## *Bryopsis plumosa* (Hudson) C. Agardh

Alga verde de hasta unos 10 cm de longitud. El eje central se ramifica de forma más o menos opuesta en ramas laterales más cortas con aspecto de pluma...

Se encuentra en rocas, piedras, charcas en el infralitoral, tanto batidos como calmados....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bryopsis-plumosa.html>

## *Balanoglossus clavigerus* (delle Chiaje, 1829)

Animal de cuerpo vermiforme, de hasta unos 30 cm de longitud, dividido en 3 zonas claramente diferenciadas. La parte anterior está ocupada por una tro...

Este animal usa su probóscide y collar para excavar galerías en fondos fangosos o arenosos del sublitoral....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balanoglossus-clavigerus.html>

## *Balaenoptera physalus* Linnaeus, 1758

Ballena de hasta unos 20 - 25 m de longitud y 40 - 50 toneladas de peso, siendo las hembras mayores que los machos. Cabeza en forma de V, con la parte...

Viajan en grupos de unos pocos hasta 100 o más individuos. Puede alcanzar 37 km/h y sumergirse hasta 250 m de profundidad. Vive hasta unos 60 años. El...

En el Atlántico presente desde el Ártico hasta las Antillas Mayores y el Pacífico desde el estrecho de Bering hasta California. Su población mundial s...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balaenoptera-physalus.html>

## *Babakina anadoni* Ortea, 1979

Nudibranquio de cuerpo alargado, con el pie largo y afilado. Tiene palpos largos y unos rinóforos de igual longitud, situados en medio de la cabeza y ...



Entre piedras y algas, alimentándose de la anémona Myriothele....

Es un nudibranquio bastante raro. De momento sólo se ha encontrado en la costa norte de España, Canarias y Gibraltar....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/babakina-anadoni.html>

## *Antalis entalis* Linnaeus, 1758

Concha tubular, curvada ligeramente, de hasta unos 5 cm de longitud, de color amarillento o blanquecino. Presenta estrías transversales y está abierta...

Usa el pie para excavar en fondos fangosos o arenosos, enterrándose verticalmente, pero dejando libre el extremo más delgado, por donde pasan las corrientes...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antalis-entalis.html>

## *Acanthochitona crinitus* (Pennant, 1777)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud, de cuerpo ovalado, elongado, unas 2.5 veces más largo que ancho. La concha está compuesta por 8 placas transversales...

Sobre rocas y bloques desde la zona infralitoral, en aguas poco profundas....

Desde la costa sur de Noruega hasta la costa oeste de África, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthochitona-crinitus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

