



Num. 36. Publicado el 15/08/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lythria purpurata*. Por César Fernández González



Num. 36. Publicado el 15/08/2005

Descripciones de especies

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Pez de hasta unos 25 cm de longitud, de cuerpo delgado. La cabeza tiene una boca grande, con la mandíbula inferior prominente. Hay 3 espinas en el opé...

Entre rocas, hasta unos 30 m de profundidad por lo general. Se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos y otros peces, como blénidos....

Desde Noruega a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/serranus-cabrilla.html>

Herponema velutinum (Greville) Agardh

Alga parda, de filamentos pequeños, de algo más de 1 mm de longitud, de color pardo oscuro....

Crece sobre las cintas de *Himanthalia elongata*, formando sobre ella una mancha aterciopelada parda....

Desde Noruega hasta el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/herponema-velutinum.html>

Elachista scutulata (Smith) Duby

Alga parda, filamentos, de hasta unos 7 mm de longitud, que surgen de una especie de base almohadillada circular...

Crece sobre cintas de *Himanthalia elongata*....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/elachista-scutulata.html>

Cladophora rupestris (L.) Kützing

Alga verde, de filamentos uniseriados cuyas células se pueden ver a la lupa debido a su gran tamaño. Los filamentos, con ramificación irregular y a ve...

En rocas en el mediolitoral e infralitoral, tanto en zonas calmadas como expuesta, adquiriendo diferentes morfologías en cada caso....

Cosmopolita....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladophora-rupestris.html>

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh

Alga verde de hasta unos 10 cm de longitud. El eje central se ramifica de forma más o menos opuesta en ramas laterales más cortas con aspecto de pluma...

Se encuentra en rocas, piedras, charcas en el infralitoral, tanto batidos como calmados....

Cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bryopsis-plumosa.html>

Balanoglossus clavigerus (delle Chiaje, 1829)

Animal de cuerpo vermiforme, de hasta unos 30 cm de longitud, dividido en 3 zonas claramente diferenciadas. La parte anterior está ocupada por una tro...

Este animal usa su probóscide y collar para excavar galerías en fondos fangosos o arenosos del sublitoral....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balanoglossus-clavigerus.html>

Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758

Ballena de hasta unos 20 - 25 m de longitud y 40 - 50 toneladas de peso, siendo las hembras mayores que los machos. Cabeza en forma de V, con la parte...

Viajan en grupos de unos pocos hasta 100 o más individuos. Puede alcanzar 37 km/h y sumergirse hasta 250 m de profundidad. Vive hasta unos 60 años. El...

En el Atlántico presente desde el Ártico hasta las Antillas Mayores y el Pacífico desde el estrecho de Bering hasta California. Su población mundial s...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balaenoptera-physalus.html>

Babakina anadoni Ortea, 1979

Nudibranquio de cuerpo alargado, con el pie largo y afilado. Tiene palpos largos y unos rinóforos de igual longitud, situados en medio de la cabeza y ...



Entre piedras y algas, alimentándose de la anémona Myriothele....

Es un nudibranquio bastante raro. De momento sólo se ha encontrado en la costa norte de España, Canarias y Gibraltar....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/babakina-anadoni.html>

Antalis entalis Linnaeus, 1758

Concha tubular, curvada ligeramente, de hasta unos 5 cm de longitud, de color amarillento o blanquecino. Presenta estrías transversales y está abierta...

Usa el pie para excavar en fondos fangosos o arenosos, enterrándose verticalmente, pero dejando libre el extremo más delgado, por donde pasan las corrientes...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antalis-entalis.html>

Acanthochitona crinitus (Pennant, 1777)

Quitón de unos 2.5 cm de longitud, de cuerpo ovalado, elongado, unas 2.5 veces más largo que ancho. La concha está compuesta por 8 placas transversales...

Sobre rocas y bloques desde la zona infralitoral, en aguas poco profundas....

Desde la costa sur de Noruega hasta la costa oeste de África, también en el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthochitona-crinitus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

