



Num. 363. Publicado el 12/03/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Poronia punctata*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 363. Publicado el 12/03/2012

Descripciones de especies

Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker

Macroscopía. Cuerpos fructíferos generalmente gregarios, subglobosos, algo irregulares, con lóbulos, de 0.5-2 cm de diámetro, con un engrosamiento bas...

No es una especie frecuente y crece asociada a encinas sobre suelos calizos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/wakefieldia-macrospora.html>

Salix triandra L.

Arbusto de 4 - 6 (10) m, con ramas tenaces y flexibles, con corteza lisa, glabra, de colorcastaño rojizo, a veces casi negro, verdoso o pardo, que s...

Crece en bordes de ríos y acequias y bosques húmedos desde los 50 a los 1700 m....

Aparece en la zona templada eurasiática. Crece por toda España y es rara en Portugal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salix-triandra.html>

Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel

Macroscopía. Ascomas diminutos y turbinados, subsésiles, aislados o confluyentes y de hasta 1 mm de diámetro. El himenio, que acaba siendo convexo, es...

Este hongo se desarrolla típicamente sobre las acículas muertas de los pinos (*Pinus sylvestris*)....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudohelotium-pineti.html>

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Es un hespérido de gran tamaño, pues tiene una envergadura alar de entre 30 y 34 mm. El macho es de color pardo muy oscuro, con varias máculas amarill...

Vive en prados húmedos, colinas herbosas y zonas arbustivas desde el nivel del mar a 800 metros. Vuela de finales de junio a primeros de agosto, en un...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/heteropterus-morpheus.html>



Glomus macrocarpum Tul. & C. Tul.

Macroscopía. Esporocarpos tuberiformes o irregularmente globosos, oblongas, lobulados, de 1-1.5 cm de diámetro, en ocasiones fijados a restos vegetales...

Crece de forma semihípoega, a menudo asociada a restos vegetales y asociado a diversas plantas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glomus-macrocarpum.html>

Novedades corológicas

Lichenopeltella pinophylla (Höhn.) P.M. Kirk & Minter (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/03/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12348.html>

Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/03/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudohelotium-pineti-batsch-fuckel-1/12345.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Lichenopeltella pinophylla (Höhn.) P.M. Kirk & Minter (Ascomycota)

Morus nigra L. (Magnoliophyta)

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Poronia erici Lohmeyer & Benkert (Ascomycota)

Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel (Ascomycota)

