



Num. 364. Publicado el 19/03/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por César Fernández González



Num. 364. Publicado el 19/03/2012

Descripciones de especies

Tricholoma josserandii Bon

Macroscopía. Hongo que forma basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, con píleos convexos, más o menos obtusamente mamelonados, de hasta 63 mm ...

Crece bajo caducifolios en sustratos ácidos, especialmente robles y castaños....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-josserandii.html>

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha de hasta 20 mm, de color blanquecino o amarillento, con el periostraco pardo y la superficie interior blanquecina. La c...

Vive en la zona costera inferior hasta 100 m de profundidad, en sustratos de gravas gruesas....

Aparece desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, oeste de África y costas de Sudáfrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/striarca-lactea.html>

Sempervivum vicentei Pau

Planta perenne, herbácea, que forma rosetas (2)4-7(9) cm de diámetro, abiertas, subaplanadas, verdes o verde-glaucas. Tallos floríferos de 8-26(34) cm...

Crece en grietas de rocas, rellanos, taludes, prados, gleras, indiferente al sustrato, desde los 600 a los 2300 m....

Endémica de los Montes del N, C y E de la Península Ibérica. Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sempervivum-vicentei.html>

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

El Morito común es un ave de 55-65 cm de longitud y 80-95 cm de envergadura, zancuda, de tonos pardos y rojizos y con un pico largo y curvado.El adult...

Vive ligada a medios acuáticos, siendo frecuente en los carrizales, pero también puede encontrarse nidificando en árboles; en el Mediterráneo se alime...



Plegadis falcinellus es una especie cosmopolita, que cría especialmente en sur y este de Europa, África y Madagascar, además del centro y sur de Asia,...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plegadis-falcinellus.html>

Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)

Mariposa con una envergadura alar es de 24-28 mm. El macho presenta el anverso de color de fondo pardo, jaspeado de pardo más oscuro y gris, y con mác...

Vive en laderas y zonas de matorral secas y cálidas, desde altitudes medias a la alta montaña. Vuela de mayo a octubre, en tres generaciones al año. C...

Está extendida por la zona meridional de Europa: Península Ibérica, Francia, Italia, Suiza... Se encuentra presente en gran parte de la Península Ibér...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carcharodus-baeticus.html>

Novedades corológicas

Podospora curvicolla (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 15/03/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/podospora-curvicolla-g-winter-niessl-1/12372.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Araujia sericifera Brot. (Magnoliophyta)

Podospora curvicolla (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

Tuber puberulum Berk. & Broome (Ascomycota)

