



Num. 365. Publicado el 26/03/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Uncinula prunastri* var. *prunastri*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 365. Publicado el 26/03/2012

Descripciones de especies

Uncinula prunastri var. *prunastri* (DC.) Sacc.

Hongo que desarrolla un micelio en las hojas, anfigeno, fino, efuso o irregularmente parcheado, de evanescente a subpersistente. Cleistotecios subgrega...

Crece sobre hojas del endrino, *Prunus spinosa*, principalmente....

Desde Europa a Asia central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uncinula-prunastri-var-prunastri.html>

Ranunculus repens L.

Planta vivaz, pluricaule, adpreso-pelosa, glabrescente o densamente hirsuta, con pelos patentes o reflejos. Rizoma premoroso, con raíces fibrosas. Tal...

Crece en terrenos húmedos, arroyos, riachuelos, depresiones, cunetas, pastos, etc., en cualquier tipo de sustrato, desde el nivel del mar a los 2200...

Aparece en Europa, Asia, N de África, América. En casi toda la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-repens.html>

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

Es una mariposa variable, con una envergadura de 30-35 mm. Las alas anteriores presentan un dibujo abigarrado de colores gris, negro y pardo, mientras...

Vuela de junio a julio, en una generación. Como plantas nutricias se han citado *Crepis capillaris*, *Hieracium pilosella* y *Medicago sativa*. ...

Al parecer está ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica vuela en la mitad septentrional y en Sierra Nevada. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hada-plebeja.html>

Camarophyllopsis atropuncta (Pers.) Arnolds

Macroscopía. Basidiomas con porte omfalinoide con píleos de hasta 19 mm de diámetro, permanentemente convexos, casi nunca aplanados ni deprimidos; hi...



Vive en suelos húmedos bajo planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/camarophyllopsis-atropuncta.html>

Araujia sericifera Brot.

Planta subarborescente de hasta de 8(10) m, perenne, de tallos volubles y pelosos. Hojas de 45-73 (120) x 14-43(50) mm, opuestas, oblongo-lanceoladas, con...

Crece en herbazales litorales, laderas pedregosas, huertos, setos, etc., desde el nivel del mar a los 700 m de altitud. ...

Planta originaria del SE de Sudamérica. Localmente naturalizada en España, en Levante, en las provincias del Cantábrico y en las regiones costeras del...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/araujia-sericifera.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anas querquedula Linnaeus, 1758 (Chordata)

Arpinia fusispora Hohmeyer (Ascomycota)

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Hymenoscyphus imberbis (Bull.) Dennis (Ascomycota)

Venerupis aurea (Gmelin, 1791) (Mollusca)

ISSN 1887-5068

