



Num. 367. Publicado el 09/04/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Macrocystidia cucumis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 367. Publicado el 09/04/2012

Descripciones de especies

Tordylium maximum L.

Hierba anual o bienal, con tallos 30-130 cm, asurcados, escasamente ramificados en la parte superior, estrigosos (con pelos setosos retrorsos). Hojas ...

Crece en bordes de caminos, cultivos y campos baldíos desde los 150 a los 1500 m de altitud...

Aparece en el centro, sur y oeste de Europa, Turquía, Crimea, S de Rusia, Cáucaso, N de Irán. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tordylium-maximum.html>

Melitaea deione Geyer, 1832

Mariposa de morfología variable, con una envergadura alar entre los 32 y los 42 mm. El macho tiene el anverso de color amarillo anaranjado claro con f...

Vive en praderas, bordes de caminos y laderas floridas, desde zonas medias-bajas hasta la alta montaña. Vuela de mayo a septiembre, en dos generac...

Está extendida por el norte de Marruecos, el oeste de Argelia, la Península Ibérica y escasos lugares del suroeste de Europa. Está presente en la ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melitaea-deione.html>

Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss.

Macroscopía. Basidiomas con un sombrero de 20-80 mm de diámetro, cónico - campanulado de joven y al final de plano a umbonado, con la superficie lisa,...

Crece en bosques de coníferas y planifolios, especialmente en los extremos de los caminos forestales creciendo entre Urtica, Rubus, asociada generalme...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrocystidia-cucumis.html>

Eupropolella britannica Greenh. & Morgan-Jones

Macroscopía: ascomas subcuticulares de hasta 0,3-0,4 mm, situados sobre manchas foliares circulares y decoloradas. Dichos ascomas son erumpentes y exp...



Se trata de un ascomycete saprófito de las hojas muertas del laurel cerezo (*Prunus laurocerasus*). ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eupropelella-britannica.html>

Asplenium onopteris L.

Helecho con un rizoma rastrero, a veces ramificado, con páleas estrechamente lanceoladas y filiformes en el ápice, de castaño-oscuros a negras, con ...

Vive en lugares algo húmedos y umbrosos de los bosques, a veces en grietas de rocas y muros; en substratos preferentemente ácidos o descalcificados, ...

Aparece en la región mediterránea, O y C de Europa, disyunta en Irlanda, región macaronésica (excepto Cabo Verde). Es frecuente en Baleares y en las...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-onopteris.html>

Novedades corológicas

Calycina vulgaris (Fr.) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 08/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/calycina-vulgaris-fr-baral-1/12491.html>

Cumanotus cuenoti Pruvot-Fol, A., 1948 (Mollusca)

Primera cita peninsular. - Citado por Marcos Fernández Iglesias en La colonia del hidrozoo del género Tubularia sobre la que se hallaban estos nudibranquios crecía, a escasos centímetros bajo la superficie del mar, sobre la parte sumergida del flotador de una batea de mejillón, en la zona interior de la Ría de Vigo., Redondela. PONTEVEDRA el día 03/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/cumanotus-cuenoti-1/12450.html>

Lasiobolus diversisporus (Fuckel) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 02/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lasiobolus-diversisporus-fuckel-sacc-1/12446.html>

Leucostoma cinctum (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Endriga, Somiedo. ASTURIAS el día 08/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12488.html>



Lophiostoma macrostomoides (De Not.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en POn Teixeina, Somiedo. ASTURIAS el día 07/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lophiostoma-macrostromoides-de-not-ces-de-not-1/12477.html>

Thelebolus dubius (Boud.) Doveri (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 04/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/thelebolus-dubius-var-lagopi-rea-doveri-1/12456.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Amphiporthe leiphaemia (Fr.) Butin (Ascomycota)

Cumanotus cuenoti Pruvot-Fol, A., 1948 (Mollusca)

Gagea foliosa subsp. *nevadensis* (Boiss.) O. Bolós ()

Gagea nevadensis Boiss. (Magnoliophyta)

Leucostoma cinctum (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

Lophiostoma macrostomoides (De Not.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Narcissus cyclamineus DC. (Magnoliophyta)

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Thelebolus dubius (Boud.) Doveri (Ascomycota)

