



## Num. 37. Publicado el 22/08/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Macrotypophula fistulosa*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 37. Publicado el 22/08/2005**

## Descripciones de especies

### *Suberites ficus* (Linnaeus, 1767)

Esponja de hasta 30 cm de diámetro, de forma muy variable, esferoidal, globosa, incrustante o lobulada, a veces semejando un conjunto de higos aplasta...

Sobre rocas o conchas en el sublitoral....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suberites-ficus.html>

### *Suberites carnosus* Johnston, 1842

Esponja de unos 15 cm de longitud, generalmente con forma globosa, fijada al sustrato por un corto pedúnculo; a veces es incrustante o lobulada. La su...

En aguas poco profundas, sobre rocas, piedras o conchas....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/suberites-carnosus.html>

### *Pomatoceros triqueter* (Linnaeus, 1767)

Poliqueto tubícola de hasta 2.5 cm de longitud, formado por 80 - 100 segmentos portadores de sedas. La cabeza tiene 2 branquias y el opérculo tiene fo...

En aguas poco profundas, formando grupos generalmente sobre rocas, bloques y otros objetos fijos....

De Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pomatoceros-triqueter.html>

### *Nephtys caeca* (Fabricius, 1780)

Poliqueto de unos 25 cm de longitud. La cabeza tiene 4 antenas en la parte anterior y una probóscide evaginable grande, con numerosas filas de papilas...



Se encuentra en el intermareal y en aguas poco profundas, entre rocas, piedras, enterrado a veces en arena o fango. Al ser molestado se entierra o nad...

Desde Noruega al Mediterráneo atlántico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nephtys-caeca.html>

## *Mullus barbatus* Linnaeus, 1758

De cuerpo alargado y comprimido lateralmente, que alcanza los 30 cm de longitud, con grandes escamas. Cabeza pequeña, de perfil casi vertical, con la ...

Sobre fondos arenosos o rocosos, hasta unos 200 m de profundidad. Los barbillones son órganos sensoriales para el gusto y tacto con los que remueve la...

Desde el Norte de las islas Británicas hasta el Mediterráneo y Senegal....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mullus-barbatus.html>

## *Lanice conchilega* (Pallas, 1766)

Gusano de hasta 30 cm de longitud, con el cuerpo formado por 150 - 300 segmentos y dividido en 2 regiones, una torácica y una abdominal. La primera, e...

En fondos blandos, enterrado, siendo sólo visible la parte ramificada final del tubo....

Desde el Ártico al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lanice-conchilega.html>

## *Goneplax rhomboides* (Linnaeus, 1758)

Cangrejo de caparazón trapezoidal, más ancho que largo, que en los machos puede alcanzar 2 cm de largo y 3.5 de ancho (en las hembras la mitad). El ca...

Hasta unos 80 m de profundidad, enterrado a veces en arena o fango. Hembras ovígeras entre marzo y mayo....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/goneplax-rhomboides.html>

## *Discodoris rosi* Ortea, 1979



Nudibranquio con el típico cuerpo de doriáceo, ovalado, algo alargado, de aproximadamente 1 cm de longitud. Color anaranjado, con zonas irregulares má...

Entre rocas y algas....

Costa atlántica de Francia y España. Mediterráneo español....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/discodoris-rosi.html>

## *Crangon crangon* (Linnaeus, 1758)

Camarón de hasta unos 9 cm de longitud, aunque no suele sobrepasar los 5. El caparazón, aplanado, mide ¼ de la longitud total del cuerpo. Las antenas ...

En aguas poco profundas, incluso estuarios, en arena o fango hasta unos 50 m de profundidad. Tiene hábitos nocturnos. Hembras ovígeras desde Febrero a...

Desde el Báltico al Mediterráneo y mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crangon-crangon.html>

## *Ancula gibbosa* (Risso, 1818)

Nudibranquio de hasta 3 cm de longitud, de cuerpo alargado. Los tentáculos orales son digitiformes y están dirigidos hacia delante. Los rinóforos tien...

Se alimenta sobre todo de ascidias del género Botryllus, aunque puede alimentarse de otros animales como entoproctos e hidrozoos como Obelia geniculat...

Desde Islandia al Mediterráneo, también en la costa N atlántica de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ancula-gibbosa.html>

