



## **Num. 38. Publicado el 29/08/2005**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por José Luis Porto Torres



**Num. 38. Publicado el 29/08/2005**

## **Descripciones de especies**

### *Trivia arctica* (Montagu, 1803)

Concha aplastada, de unos 10 mm de largo, delgada y muy calcificada, con una espira muy corta que tiene la superficie pulida y atravesada por unas 20 ...

Sublitoral, en costas rocosas y estuarios. Se encuentra generalmente entre ascidias, de las que se alimenta....

Desde Noruega al Cantábrico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trivia-arctica.html>

### *Scorpaena scrofa* (Linnaeus, 1758)

Pez robusto, de 30 a 50 cm de longitud, de cabeza grande, cubierta de espinas y apéndices dérmicos, con una fosa nugal no muy pronunciada. La boca es ...

Pez solitario, vive en el fondo, permaneciendo inactivo durante el día y cazando de noche góbidos, crustáceos y otros invertebrados. Hasta 200 m de pr...

Desde las Islas Británicas a Senegal, Madeira, Canarias, Azores y Mediterráneo, ausente en el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scorpaena-scrofa.html>

### *Scorpaena porcus* (Linnaeus, 1758)

Pez robusto, de hasta 25 cm de longitud, de cabeza grande, cubierta de espinas y apéndices dérmicos, con una fosa nugal. La boca es grande, con diente...

Pez solitario, vive en el fondo, permaneciendo inactivo durante el día y cazando de noche góbidos, blénidos, crustáceos y otros invertebrados. Hasta 3...

Desde las Islas Británicas a las Azores, Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scorpaena-porcus.html>

### *Pycnogonum littorale* (Strøm, 1762)

Cuerpo de unos 5 mm de longitud, cubierto de tubérculos; carece de quelíceros y palpos. La probóscide es cónica, más corta que el tronco, el cual



tien...

En aguas poco profundas, bajo piedras, rocas, alimentándose de anémonas, poliquetos e hidrozoos....

Desde el norte de Europa al sur de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pycnogonum-littorale.html>

## *Polynoe scolopendrina* Savigny, 1820

Poliqueto de hasta 12 cm de longitud, con el cuerpo alargado, ligeramente comprimido y formado por 80 - 100 segmentos. Tiene 15 pares de élitros en pa...

En aguas poco profundas, en grietas o en piedras....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polynoe-scolopendrina.html>

## *Nymphon gracile* Leach 1814

Cuerpo de hasta 1 cm de longitud, con la probóscide corta, 2 veces más larga que ancha; detrás de ella un par de quelíceros o apéndices alimenticios y...

En aguas poco profundas, sobre anémonas, briozoos y también hidrozoos....

Desde el O de Noruega y las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nymphon-gracile.html>

## *Leucosolenia complicata* (Montagu, 1818)

Esponja pequeña, formada por una red incrustante de canales fijados al sustrato de los que salen tubos de hasta 2 cm de altura, finos y con un ósculo ...

Sobre rocas o algas en aguas poco profundas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-complicata.html>

## *Leucosolenia botryoides* (Ellis & Solander, 1786)



Esponja pequeña, formada por una red incrustante de canales fijados al sustrato de los que salen tubos de hasta 2 cm de altura, finos y con un ósculo

...

Sobre rocas o algas en aguas poco profundas....

Desde el norte de Europa al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucosolenia-botryoides.html>

## *Goniodoris castanea* Alder & Hancock, 1845

Nudibranquio de 35-38 mm de longitud, de color pardo rojizo, con moteado blanco que permite al animal mantenerse críptico con el fondo. El dorso y los...

Vive en aguas poco profundas, generalmente a menos de 25 m de profundidad, donde se alimenta de ascidias como *Ascidia mentula*, *Botrylloides leachii*, B...

Costa atlántica europea....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/goniodoris-castanea.html>

## *Aegires punctilucens* (d'Orbigny, 1837)

Nudibranquio de cuerpo estrecho, alargado, de hasta 15 mm de longitud, fácil de identificar por tener el cuerpo lleno de tubérculos alargados acabados...

Nudibranquio bastante raro y difícil de encontrar, ya que, además de su pequeño tamaño, se camufla perfectamente en la esponja *Leucosolenia botryoides*...

Desde Noruega hasta el Mediterráneo, también en Japón y Australia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aegires-punctilucens.html>

