



Num. 386. Publicado el 20/08/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Floronia bucculenta*. Por Rafa González



Num. 386. Publicado el 20/08/2012

Descripciones de especies

Tuber puberulum Berk. & Broome

Macroscopía. Ascocarpos hipogeos de 5-11 mm de diámetro, de globulosos a tuberiformes, en ocasiones lobulados por la presencia de algunos leves surcos...

Especie hipogea que crece asociada a varios árboles, como *Corylus avellana*, *Quercus ilex*, *Quercus robur*, *Pinus radiata*, etc....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M. A., LINDE, Jesús, SUÁREZ, A., GARCÍA, F & JUSTE, P.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tuber-puberulum.html>

Campanula adsurgens Levier & Leresche

Planta perenne, de hasta de 40 cm, con un rizoma más o menos horizontal, ramificado, de cuyos ápices nacen numerosos tallos aéreos, sin tubérculos. Ta...

Vive en las fisuras y repisas de roquedos calcáreos, desde los 500 a los 2000 m de altitud....

Planta endémica de los Montes de León y el oeste de la Cordillera Cantábrica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-adsurgens.html>

Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767

Escarabajo de 13-20 mm de longitud, unas tres veces más largo que ancho. El lóbulo epipleural de los élitros es angulosamente saliente por los costado...

Vive ligado a pinares, donde sus larvas se alimentan de la madera muerta de pinos y en ocasiones de otras coníferas como *Picea* y *Larix*....

Aparece prácticamente en toda Europa continental, Siberia occidental, Cáucaso, Turquía, África del Norte. En España en casi todo el territorio salvo q...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/buprestis-novemmaculata.html>

Arenaria montana L.

Planta cespitosa, pluricaule, retrorso-pubescente, de hasta 30(35) cm, con ramas principales postradas, con indumento de pelos cortos, eglandulosos,...

Vive en melojares y robledales aclarados, pinares, brezales, alcornocales, pedregales, roquedos, etc..preferentemente sobre substrato ácido, desde l...



Aparece en Francia, Península Ibérica, N de Africa. En la mayoría de la Península, salvo gran parte del E y SE....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-montana.html>

Agaricus impudicus (Rea) Pilát

Macroscopía. Hongo que desarrolla basidiomas con un sombrero de 6 a 10 cm de diámetro, de hemisférico a convexo para volverse luego plano y submamelon...

Vive en bosques de coníferas y planifolios, en los que aparece de primavera a otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agaricus-impudicus.html>

Novedades corológicas

Floronia bucculenta (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Nuevo para Asturias - Citado por Rafa González en Soto de Aguas (Sobrescobio), Sobrescobio. ASTURIAS el día 16/08/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/floronia-bucculenta/13573.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ecdyonurus torrentis Kimmins, 1942 (Arthropoda)

Floronia bucculenta (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Hypselodoris picta (Schultz in Philippi 1836) (Mollusca)

Scutellinia legaliae Lohmeyer & Häffner (Ascomycota)

Scutellinia nigrohirtula (Svrcek) Le Gal (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

