



Num. 39. Publicado el 05/09/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Alvania lactea*. Por César Fernández González



Num. 39. Publicado el 05/09/2005

Descripciones de especies

Thalassema thalasseum (Pallas, 1766)

Gusano de unos 7 centímetros de longitud sin contar la probóscide, que puede llegar hasta cerca de 20 centímetros en su mayor nivel de expansión.
Los ...

Entre piedras y rocas en la zona infralitoral....

Desde las Islas Británicas a la Península Ibérica....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos y MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis
Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thalassema-thalasseum.html>

Sacculina carcini Thompson, 1836

Especie parásita, de hasta 26 mm de longitud, con el cuerpo en forma de saco, con una apertura y un pedúnculo con el que se fija a su hospedador situa...

Vive en el abdomen de *Carcinus maenas*, más raramente en *Necora puber*. Se distingue de los huevos por tener una textura lisa....

Por asturnatura.com
Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sacculina-carcini.html>

Priapulus caudatus Lamarck, 1816

Gusano de cuerpo no segmentado, aunque externamente aparenta estarlo. Alcanza unos 8 cm de longitud, con cuerpo grueso, cilíndrico; en el extremo ante...

Excavando en arena o fango....

Atlántico y Mediterráneo oeste....

Por asturnatura.com
Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/priapulus-caudatus.html>

Phascolosoma granulatum Leuckart, 1828

Gusano de unos 10 cm de longitud, con una trompa o probóscide retráctil donde está situada la boca, con unos 12 - 60 tentáculos dispuestos en forma de...

Vive en arena, entre piedras, hasta unos 90 m de profundidad....



Aparece desde las costas de Noruega y Francia hasta Cabo Verde y todo el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponibile en <http://www.asturnatura.com/especie/phascolosoma-granulatum.html>

Phascolion strombus (Montagu, 1804)

Gusano de unos 5 cm de longitud, con una trompa o probóscide retráctil donde se encuentra la boca. Rodeando la boca unos 8 - 16 en individuos jóvenes ...

En conchas de gasterópodos, como Aporrhais, Turritella y Dentalium, donde tapa la apertura de la concha con partículas dejando sólo un pequeño agujero...

Por asturnatura.com

Disponibile en <http://www.asturnatura.com/especie/phascolion-strombus.html>

Lineus bilineatus (Renier, 1804)

Gusano de hasta 50 cm de longitud y 6 mm de diámetro (dependiendo de su grado de contracción), de cuerpo fino y ahusado, con la cabeza sin ojos pero c...

En aguas poco profundas, en intermareal, en grava, arena, barro, a veces entre algas tipo Corallina o mejillones....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponibile en <http://www.asturnatura.com/especie/lineus-bilineatus.html>

Golfingia elongata (Keferstein, 1862)

Gusano de unos 10 - 15 cm de longitud, de cuerpo muy contráctil y ahusado. La probóscide, de unos 5 cm de longitud, tiene 8 tentáculos y 20 anillos de...

Vive enterrado en arena, hasta unos 170 m de profundidad....

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponibile en <http://www.asturnatura.com/especie/golfingia-elongata.html>

Echiurus echiurus (Pallas, 1767)

Gusano de unos 11 - 15 cm de longitud, cilíndrico, ahusado en los extremos. Probóscide de hasta 4 cm, en forma de pala. El cuerpo formado por 21 - 23 ...

Enterrado en arena, donde excava galerías en forma de U....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echiurus-echiurus.html>

Diazona violacea Savigny, 1816

Ascidia que forma colonias más o menos globulares (casi e 100 individuos), de unos 20 cm de altura y 30 - 40 cm de diámetro, de base más estrecha que ...

En rocas, piedras, a menudo en zonas con bastante corriente hasta los 200 m de profundidad....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diazona-violacea.html>

Apletodon dentatus (Facciolà, 1887)

Pez pequeño, de unos 5 cm de longitud, de cuerpo aplanado con las aletas pélvicas modificadas en una ventosa ventral. Carece de escamas. La cabeza es ...

En aguas poco profundas, a menudo entre bulbos de Saccorhiza, alimentándose de pequeños crustáceos y otros invertebrados....

Desde Inglaterra al Mediterráneo, incluido el Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apletodon-dentatus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Pyrgus cirsii (Rambur, 1840) (Arthropoda)

