



Num. 395. Publicado el 22/10/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Orobanche teucriti*. Por Ignacio Fernandez Villar



Num. 395. Publicado el 22/10/2012

Descripciones de especies

Verbascum virgatum Stokes

Planta herbácea bienal y pubescente, con tallos de 40 a 110 cm, lisos o algo angulosos, simples o ramificados, pubescentes (con pelos toectores simples...

Crece en cunetas, taludes descarnados, baldíos, en suelos arenosos y lugares alterados algo nitrificados y húmedos, desde los 200 a los 1400 m....

Aparece en el oeste Europa: Península Ibérica, Francia, Inglaterra y N de Italia; introducida en América, Canarias y Azores. Está dispersa por toda la...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/verbascum-virgatum.html>

Ustilago echinata J. Schröt.

Hongo de tipo carbón que forma soros en las vainas y hojas de las plantas que parasita, formando bandas notorias que en ocasiones se interrumpen; es n...

Crece parasitando numerosas especies de gramíneas, como *Glyceria*, *Phalaris* y *Scolochloa*. Es frecuente sobre *Phalaris arundinacea*....

Aparece en Europa, Asia y el norte de América....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ustilago-echinata.html>

Taphrina populina (Fr.) Fr.

Este hongo produce abultamientos más o menos globosos de color amarillo dorado a las hojas de *Populus*, generalmente pequeños, de 5 a 10 mm de diámetro...

Crece en las hojas de numerosas especies de *Populus*, como *Populus nigra*, *Populus deltoides* y *Populus canadensis*...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/taphrina-populina.html>

Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758)

Pequeño cangrejo con un caparazón de 12 mm las hembras y 7 los machos, de cuadrado a transversalmente ovalado y liso y color pardusco, en ocasiones al...

Se trata de un cangrejo parásito que vive en la cavidad del manto de muchos molucos bivalvos, como *Atrina fragilis*, *Modiolus modiolus*, *Ostrea*



edulis, ...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nepinnotheres-pinnotheres.html>

Armeria cantabrica Boiss. & Reut. ex Willk. in Willk. & Lange

Planta densamente cespitosa; cepa muy ramificada. Ramas apretadas. Hojas (10) 15-60 x (0,7) 1-2,5(3,5) mm, lineares o sublineares, de ápice generalmente...

Vive en los rellanos o fisuras de roca, generalmente de naturaleza caliza, desde los 1200 a los 2400 m de altitud...

Planta endémica de las montañas del N de la Península, desde la Sierra de Ancares hasta las sierras de Cantabria y Codés...

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-cantabrica.html>

Novedades corológicas

Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 16/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cistella-grumosa-senn-irlet-aeberh-1/14117.html>

Taphrina populina (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en Cercanías de Pineda., Somiedo. ASTURIAS el día 21/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/taphrina-populina/14159.html>

Tubulanus nothus (Bürger, 1892) (Nemertina)

Nuevo para la Península Ibérica - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Entre A Guarda y Santa María de Oia, a unas 30 brazas de profundidad., Oia. PONTEVEDRA el día 16/10/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/tubulanus-nothus-1/14114.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acholoe squamosa (Delle Chiaje, 1827) (Annelida)

Bromus catharticus Vahl (Magnoliophyta)



Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh. (Ascomycota)

Doronicum grandiflorum Lam. (Magnoliophyta)

Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trott. (Basidiomycota)

Marasmius hederæ (Kühner) J. Favre (Basidiomycota)

Mycena aetites (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Orobanche teucrii Holandre (Magnoliophyta)

Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer (Basidiomycota)

Taphrina populina (Fr.) Fr. (Ascomycota)

Tichodroma muraria Illiger, 1811 (Chordata)

Tubulanus nothus (Bürger, 1892) (Nemertina)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008